

Sikkerhedsanbefaling for patienten  
Behold venligst dette kort på dig

# Patient informationskort

## Vigtige sikkerhedsoplysninger for akutberedskab/skadestue

**Jinarc® kan forårsage leverskade.** Der skal udføres leverfunktionstest (blodprøve) regelmæssigt (hver måned i de første 18 måneder, derefter hver 3. måned). Ved tegn på leverskade eller unormale stigninger i ASAT og ALAT, skal behandlingen med Jinarc® øjeblikkeligt afbrydes.

**Jinarc® blokerer vasopressins virkning i nyrerne og kan forårsage stor urinvolumen og svær dehydrering.**

Symptomer på dehydrering kan være øget tørst, mundtørhed, træthed, mindsket urinudskillelse, hovedpine, tør hud, svimmelhed, forvirring og øget hjerterytme.

Yderligere oplysninger på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

Patientens navn:

---

Dato for første ordination af Jinarc®:

---

Lægens navn:

---

Hospitalets navn:

---

Hospitalets telefonnummer:

---

## Vigtige sikkerhedsoplysninger for patienter

### **Jinarc® kan påvirke din leverfunktion.**

Søg læge, hvis du får symptomer som træthed, appetitløshed, mavesmerter, feber, mørk urin, gulfarvning af huden eller øjnene (gulsot), alvorlig dehydrering, kvalme, opkast, kløe eller led- og muskelsmerter med feber.

### **Jinarc® kan forårsage alvorlig dehydrering.**

Drik rigeligt med væske for at undgå dehydrering. Søg læge, hvis du ikke er i stand til at drikke væske.