

Indlægsseddel: Information til patienten

Diclofenac rapid Teva 50 mg filmovertrukne tabletter diclofenackalium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Diclofenac rapid Teva
3. Sådan skal du tage Diclofenac rapid Teva
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

1. Virkning og anvendelse

Diclofenac rapid Teva indeholder diclofenackalium.

Diclofenac rapid Teva virker **smertestillende** (kaldes et analgetika) og **betændelseshæmmende** (anti-inflammatorisk).

Lægemidler med disse eller lignende virkninger kaldes nonsteroid antiinflammatoriske lægemidler eller NSAID'er.

Diclofenac rapid Teva bruges til:

Kortvarig behandling af følgende tilstande

- reumatiske sygdomme i det bløde væv (hævelse og irritation af muskler og led)
- smerte- og betændelsesstilstande efter skader og operationer (herunder tandoperationer)
- menstruationssmerter
- akut behandling af migræne med eller uden aura.

Diclofenac rapid Teva bør ikke anvendes til børn under 16 år.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Diclofenac rapid Teva

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Diclofenac rapid Teva

- hvis du tror, at du kan være allergisk over for diclofenac, acetylsalicylsyre, ibuprofen eller andre NSAID'er (nonsteroid antiinflammatoriske lægemidler) eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (disse er anført i punkt 6 i indlægssedlen). Tegn på overfølsomhedsreaktion omfatter hævelse i ansigt og mund (angioødem), vejrtrækningsbesvær, smerter i brystet, løbende næse, hududslæt eller andre allergilignende reaktioner.
- hvis du tidligere har haft allergiske reaktioner, f.eks. astma, snue eller udslæt, når du har taget acetylsalicylsyre eller andre smertestillende lægemidler inden for gruppen af NSAID'er.
- hvis du har mavesår eller sår i tolvfingertarmen, blødninger eller perforeringer.

- hvis du har haft blødninger eller perforeringer i maven på grund af tidligere brug af smertestillende midler (NSAID'er).
- hvis du har haft to eller flere episoder med mavesår eller blødning.
- hvis du er gravid og er mere end 6 måneder henne i graviditeten.
- hvis du har alvorlige lever- og nyreproblemer.
- hvis du har fået diagnosticeret hjertesygdom og/eller cerebrovaskulær sygdom, f.eks. hvis du har haft et hjertetilfælde, slagtilfælde, forbigående svigt i blodtilførslen (TCI) eller blodprop i blodårerne til hjertet eller hjernen, eller hvis du har fået foretaget en ballonudvidelse eller bypassoperation.
- hvis du har eller har haft kredsløbsproblemer.
- hvis du har øget forekomst af rødt farvestof i urinen.
- hvis du har lidelser med øget blødningstendens, herunder blødningsdiatese.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Diclofenac rapid Teva

- hvis du for nylig har eller snart skal have foretaget et operativt indgreb i mave-tarm-kanalen, da diclofenac indimellem kan hæmme sårhelingen i mave-tarm-kanalen efter kirurgi.
- hvis du lider af bronkial astma (sygdom i luftvejene, der giver vejrtrækningsbesvær), sæsonbetonet allergisk snue, hævelse af slimhinderne i næsen (næsepolypper), en kronisk lungesygdom eller infektioner i luftvejene.
- hvis du har en lidelse, der gør det svært for blodet at størkne.
- hvis du har en nyrefunktionslidelse.
- hvis du har væsentlig væskemangel (f.eks. på grund af sygdom, diarré, eller før eller efter en operation).
- hvis du har en leversygdom.
- hvis du har en tilstand kaldet porfyri.
- hvis du har en sygdom i mave-tarm-kanalen, f.eks. ulcerativ colitis eller Crohns sygdom (en særlig tarmsygdom).
- hvis du er i risiko for at få en infektion (Diclofenac rapid Teva kan skjule symptomer på infektion, såsom hovedpine eller feber. Dette kan gøre det mere vanskeligt at opdage og behandle infektionen. Hvis du føler dig utilpas og går til lægen, skal du derfor huske at fortælle lægen, at du tager Diclofenac rapid Teva.
- hvis du ryger.
- hvis du har sukkersyge (diabetes mellitus).
- hvis du har hjertekrampe (angina), blodpropper, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol eller forhøjede triglycider.
- hvis du har eller har haft en hjertesygdom.
- hvis du tidligere har fået et alvorligt hududslæt eller hudafskalning, blæredannelse og/eller mundsår efter at have taget Diclofenac rapid Teva eller andre smertestillende lægemidler.

Hvis du oplever smerter i brystet, når du tager Diclofenac rapid Teva, skal du straks kontakte lægen. Smerter i brystet kan være tegn på en potentielt alvorlig allergisk reaktion, der kaldes Kounis syndrom.

Bivirkninger kan minimeres ved at bekæmpe symptomerne i så kort tid og med **så lav dosis som muligt**.

Længere tids brug af et smertestillende middel mod hovedpine kan forværre hovedpinen. Hvis du oplever dette eller har mistanke om, at dette gælder for dig, bør du afbryde behandlingen og søge læge.

Laboratorieundersøgelser

Hvis du tager Diclofenac rapid Teva gennem længere tid, vil din læge regelmæssigt tjekke dine leverværdier, din nyrefunktion og dine blodtal.

Blødning i mave-tarm-kanalen, sår og hul på tarmen

Behandling med ethvert nonsteroid antiinflammatorisk lægemiddel (NSAID) kan forårsage blødning i mave-tarm-kanalen, sår og hul på tarmen, der kan være dødeligt. Risikoen for at blive syg er højere

- ved højere dosis af NSAID
- hos patienter, der allerede har sår, særligt hvis de også har haft blødning eller hul på tarmen
- hos ældre patienter.

Hvis du har en af disse risikofaktorer, og/eller hvis du samtidig er i behandling med

- lav dosis af acetylsalicylsyre (ASA) som et blodfortyndende lægemiddel
- andre lægemidler, der øger risikoen for sygdom i mave-tarm-kanalen

kan din læge vælge at give dig et lægemiddel, der beskytter mave-tarm-kanalen.

Hvis du **tidligere har haft bivirkninger i mave-tarm-kanalen**, skal du kontakte din læge, hvis du oplever usædvanlige mave-tarm-symptomer. Dette gælder primært blødning fra maven og tarmene. Blødning kan genkendes ved, at opkast eller afføring farves sort. Ældre er i særlig risiko for dette.

Hvis du får blødning eller sår fra mave-tarm-kanalen, mens du er i behandling med Diclofenac rapid Teva, skal du stoppe behandlingen.

Påvirkninger af hjerte-kar-systemet og det cerebrovaskulære system (blodforsyning til hjernen)

Lægemidler som Diclofenac rapid Teva kan være forbundet med en let forøget risiko for hjertetilfælde og slagtilfælde. Risikoen øges ved brug af høje doser og ved længere tids brug. Den anbefalede dosis og behandlingstid bør ikke overskrides.

Hvis du på noget tidspunkt, mens du tager Diclofenac rapid Teva, oplever nogen tegn eller symptomer på hjerte- eller blodkarproblemer, såsom brystmerter, åndenød, svaghed eller sløret tale, skal du straks kontakte din læge.

Hudreaktioner

Der er meget sjældent set alvorlige hudreaktioner ved behandling med et NSAID i form af rødme og blærer, nogle gange med fatalt udfald. Ved de første tegn på en lidelse, der påvirker din hud eller slimhinder, skal du **stoppe** med at tage Diclofenac rapid Teva og informere din læge med det samme. Dette gælder også ved andre tegn på overfølsomhedsreaktioner (se også punkt 4).

Ældre patienter

Bivirkninger ved NSAID forekommer hyppigere hos ældre personer eller skrøbelige ældre personer. Blødning og hul i mave-tarm-regionen er de bivirkninger, der er særligt bekymrende, og som i nogle tilfælde kan være livstruende.

Børn og unge

Diclofenac rapid Teva 50 mg må ikke anvendes til børn under 16 år.

Brug af andre lægemidler sammen med Diclofenac rapid Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.

Du bør ikke tage Diclofenac rapid Teva samtidig med:

- **andre** anti-inflammatoriske og smertestillende lægemidler fra gruppen af nonsteroid antiinflammatoriske lægemidler (**NSAID'er**)
- **COX-2-hæmmere** såsom celecoxib (også kaldet antiinflammatoriske substanser)
- **glukokortikoider** (antiinflammatoriske lægemidler).

Din læge vil vurdere dette ud fra den enkelte patients behov.

Forsigtighed er især påkrævet, hvis du er i behandling med:

- **digoxin** (lægemiddel, der øger hjertets styrke)
- **litium** (lægemiddel til behandling af mentale lidelser)
- lægemidler, der **virker mod ophobning af væske i kroppen** (vanddrivende lægemidler)

- **lægemidler til behandling af nedsat hjertefunktion og forhøjet blodtryk, herunder betablokkere, ACE-hæmmere og angiotensin-II receptorantagonister**
- visse **lægemidler til behandling af depression** (selektive serotoningenoptagshæmmere/SSRI)
- **methotrexat** (lægemidler mod gigt)
- **antikoagulantia**, lægemidler som f.eks. warfarin (mod blodpropper)
- **lægemidler mod blodpropper** såsom acetylsalicylsyre (ASA)
- **ciclosporin og tacrolimus** (lægemidler til behandling af inflammatoriske sygdomme og efter transplantationer)
- lægemidler, der **sænker blodsukkeret** såsom metformin (antidiabetika)
- **quinoloner** (antibiotikum mod bakterieinfektioner)
- **colestipol/cholestyramin** (lægemidler mod forhøjet fedtniveau i blodet)
- **phenytoin** (lægemiddel mod kramper)
- **voriconazol** (lægemiddel mod svampeinfektioner)
- **rifampicin og trimethoprim** (lægemidler mod bakterielle infektioner)
- **carbamazepin** (lægemiddel mod epilepsi)
- **barbiturater** (f.eks. phenobarbital, et lægemiddel mod epilepsi)
- **sulfinpyrazon** (mod gigt).

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke tage Diclofenac rapid Teva, hvis du er i de sidste 3 måneder af graviditeten, da det kan skade dit ufødte barn eller forårsage problemer under fødslen. Det kan forårsage nyre- og hjerteproblemer hos dit ufødte barn. Det kan have indvirkning på din eller din babys tendens til at bløde og kan forsinke fødslen eller få den til at vare længere.

Du bør ikke tage Diclofenac rapid Teva i de første 6 måneder af graviditeten, medmindre det er absolut nødvendigt og aftalt med lægen. Hvis du har brug for behandling i denne periode, eller mens du forsøger at blive gravid, skal du tage den lavest mulige dosis i så kort tid som muligt. Hvis du tager Diclofenac rapid Teva i mere end et par dage fra 20. graviditetsuge og fremefter, kan Diclofenac rapid Teva forårsage nyreproblemer hos dit ufødte barn, hvilket kan forårsage nedsat mængde fostervand, der omgiver din baby (oligohydramnion) eller indsnævring af blodkarrene (ductus arteriosus) i babyens hjerte. Hvis du har brug for behandling i mere end et par dage, kan lægen anbefale ekstra kontrol.

Amning

Det aktive stof diclofenac udskilles i modermælken i små mængder. Derfor bør du ikke tage Diclofenac rapid Teva, samtidig med at du ammer.

Frugtbarhed (hos kvinden)

Som andre lægemidler, der hæmmer prostaglandinsyntesen (dannelsen af visse vævshormoner), kan Diclofenac rapid Teva medvirke til, at det bliver sværere at blive gravid. Du skal fortælle det til din læge, hvis du planlægger at blive gravid eller har haft problemer med at blive gravid.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diclofenac rapid Teva kan give bivirkninger såsom synsforstyrrelser og svimmelhed, dødsighed og søvnighed. Som resultat kan din reaktionsevne blive påvirket, og derved kan evnen til at færdes sikkert i trafikken og anvende maskiner blive svækket.

Diclofenac rapid Teva indeholder lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Diclofenac rapid Teva indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. filmovertrukket tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.

3. Sådan skal du tage Diclofenac rapid Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Dosering og indgivelsesmåde

Tag Diclofenac rapid Teva med en **lille smule vand og gerne før et måltid. Tabletten må ikke tygges.**

Hvor længe og hvor meget Diclofenac rapid Teva du må tage

Lægen vil vurdere, hvor længe behandlingen skal vare.

Du må ikke overskride den anbefalede dosis. Det er vigtigt, at du bruger den laveste dosis, der holder smerterne under kontrol, og at du ikke bruger dette lægemiddel i længere tid end nødvendigt. Din læge vil ordinere de passende doser til dig. Din læge kan ordinere en højere eller lavere dosis afhængigt af, hvordan lægemidlet påvirker dig.

Anbefalet dosis til voksne og børn over 16 år

Den indledende dosis er som regel 2-3 Diclofenac rapid Teva-tabletter dagligt. Ved svage smerter er en dosis på 1-2 tabletter dagligt ofte tilstrækkeligt. Den daglige dosis fordeles på 2-3 doser.

Menstruationssmerter

1-3 Diclofenac rapid Teva-tabletter dagligt, fordelt på 1-3 doser.

Dosis fastlægges individuelt. En lav dosis (1-2 tabletter dagligt) bør tages i begyndelsen af behandlingen og kan øges gradvist efter aftale med lægen.

Behandlingen påbegyndes, når de første symptomer på smerte opstår og fortsætter i et par dage afhængigt af smertens intensitet.

Migræne

Tag 1 Diclofenac rapid Teva-tablet ved de første tegn på et anfald.

Hvis der inden for 2 timer efter indtagelse ikke opnås tilstrækkelig smertelindring, kan der tages yderligere en tablet. Hvis det er nødvendigt, kan der tages supplerende doser på 1 tablet hver 4.-6. time. **Tag ikke mere end 4 Diclofenac rapid Teva-tabletter om dagen!**

Ældre patienter

Den laveste effektive dosis bør anvendes især til behandling af svage patienter eller patient med lav kropsvægt.

Patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion

Diclofenac må ikke anvendes til patienter med alvorligt nedsat nyre- eller leverfunktion (se punkt 2 ”Tag ikke...”). Der skal udvises forsigtighed, hvis du har mild til moderat nedsat nyre- eller leverfunktion (se punkt 2 ”Advarsler og forsigtighedsregler”). Lægen vil muligvis justere din dosis eller undersøge dig oftere.

Brug til børn og unge

Diclofenac rapid Teva må ikke anvendes til børn og unge under 16 år.

Hvis du har taget for meget Diclofenac rapid Teva

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket med det samme, hvis du har taget mere af Diclofenac rapid Teva, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Du kan have brug for lægebehandling.

Tag æsken med dig, så lægen kan se, hvad du har taget. Følgende bivirkninger kan forekomme: opkastning, blødning i maven, diarré, svimmelhed, høreproblemer eller anfald. Ved alvorlig overdosis kan der opstå nyre- eller leverproblemer.

Hvis du har glemt at tage Diclofenac rapid Teva

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis, men fortsæt behandlingen med den næste dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne er som regel afhængige af dosis og er forskellige fra patient til patient. Risikoen, særligt for blødninger i mave-tarm-kanalen (sår, skader på slimhinden, betændelse maveslimhinden) og den øgede risiko for arterielle trombotiske hændelser (for eksempel hjerteanfald eller slagtilfælde), afhænger af dosis og behandlingsvarighed.

Alvorlige bivirkninger og foranstaltninger

Stop med at bruge Diclofenac rapid Teva, og søg lægehjælp med det samme, hvis du oplever noget af følgende:

- Øget hjerterytme, blodtryksfald, der fører til chok (dette kan være tegn på alvorlige overfølsomhedsreaktioner). Dette kan opstå første gang, du tager Diclofenac rapid Teva, men det er sjældent.
- Hævelse af ansigt, læber, mund, tunge eller svælg, som kan forårsage synke- eller åndedrætsbesvær (angioødem). Dette er meget sjældent.
- Alvorlige hudreaktioner, herunder blæredannelse, rødt eller lilla udslæt eller afskalning af huden. Det kan også påvirke mund, øjne og andre slimhinder (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse eller erythema multiforme). Dette er meget sjældent.
- En alvorlig allergisk hudreaktion, der kan omfatte store udbredte røde og/eller mørke pletter, hævelse af huden, blærer og kløe (generaliseret bulløs erythema fixum).
- Stærke **smarter i den øvre del af maven**, opkastning, blodigt opkast, blodig diarré og sortfarvet afføring (dette kan være tegn på blødning eller sår i mave eller tarm). Dette er sjældent.
- **Milde mavekrampe og ømhed i maven**, der starter kort efter start på behandling med Diclofenac rapid Teva og fortsætter med blødning fra endetarmen eller blodig diarré, almindeligvis inden for 24 timer efter mavesmerternes opståen. Dette forekommer meget sjældent.
- **Overfladiske læsioner** i munden, feber, ondt i halsen, næseblod og blå mærker, influenzalignende symptomer, ekstrem udmattelse (dette kan være tegn på forstyrrelse i bloddannelsen, reduktion i antallet af forskellige blodlegemer). Dette er meget sjældent. Tag ikke lægemidler til at sænke feberen.
- Kraftig **hovedpine**, kvalme, opkastning, **feber**, nakkestivhed eller sløret bevidsthed (dette kan være tegn på meningitis). Dette er meget sjældent.
- **Nedsat udskillelse af urin**, ophobning af vand i kroppen og generel træthed (dette er tegn på nyresygdom eller nyresvigt). Dette er meget sjældent.
- **Smarter i brystet**, der kan være tegn på en potentielt alvorlig allergisk reaktion, der kaldes Kounis syndrom. Kontakt din læge med det samme, hvis du får smerter i brystet. Hyppigheden er ikke kendt; dette betyder, at hyppigheden ikke kan estimeres ud fra forhåndenværende data.
- **Pludselige og knugende brystsmarter** (tegn på en blodprop i hjertet). Dette er ikke almindeligt.
- **Åndenød, vejrtrækningsbesvær**, når du ligger ned, **hævelse** i fødder eller ben (tegn på hjertesvigt). Dette er ikke almindeligt.

Hvis følgende bivirkninger opstår, skal du **informere en læge** hurtigst muligt:

- **Nældefeber** (en slags nubret udslæt, der er blegrødt og kløende). Dette er sjældent.

Andre bivirkninger

Følgende andre bivirkninger kan opstå under behandling med Diclofenac rapid Teva:

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

- hovedpine, svimmelhed.
- en følelse af at det hele snurrer rundt.
- smerter i den øvre del af maven, kvalme, opkastning, diarré, forstoppelse, øget dannelse af tarmgas, appetitløshed.
- øget mængde af leverenzymmer.
- hududslæt og hudirritation.

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

- hurtig eller uregelmæssig hjerterytme (hjerteranken), brystmerter.

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

- døsigthed.
- hvæsende og besværet åndedræt (astma).
- forstyrrelser i leverfunktionen, herunder leverbetændelse med eller uden gulsot.
- betændelse af maveslimhinden, sår i mave-tarm-kanalen (evt. med blødning, tilstopning eller hul, hvilket kan medføre bughindebetændelse med symptomer som mavesmerter og/eller oppustethed og feber).
- væskeophobning. Symptomerne på dette er bl.a. hævede ankler.

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

- mentale/følelsesmæssige lidelser, depression, ængstelse, mareridt.
- forstyrrelser i opfattelsesevnen, hukommelsesforstyrrelser, ændret opfattelse af tid og sted, søvnløshed, pirrelighed, krampetrækninger, skælven.
- smagsforstyrrelser.
- følelseløshed eller stikkende fornemmelse i hænderne, fingrene og fødderne.
- synsforstyrrelser (sløret syn eller dobbeltsyn).
- hjerneblødning.
- summen i ørerne og nedsat hørelse.
- forhøjet blodtryk.
- betændelse i blodkar.
- lungebetændelse.
- symptomer fra og lidelser i den nedre del af mave-tarm-kanalen, såsom blødning og betændelse, forværring af Crohns sygdom/ulcerativ colitis.
- betændelse i munden eller tungen, beskadigelse af spiserøret, forstoppelse, kramper i den øvre del af maven, især efter måltider (tegn på tarmforsnævring).
- betændelse i bugspytkirtlen.
- influenzalignende symptomer, træthed, muskelsmerter, forhøjede leverenzymniveauer i blodet (tegn på leverdysfunktion, såsom fulminant leverbetændelse, levernekrose, leversvigt).
- små blødninger under huden (purpura, kan også skyldes allergi), hududslæt, eksem, lysfølsomhedsreaktioner, rødme i huden, kløe, betændte blistre på huden.
- alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag (tegn på såkaldt eksfoliativ dermatitis).
- hårtab.
- akut nyrefunktionslidelse, blod og protein i urinen, nefrotisk syndrom (symptomkompleks med ophobning af vand i kroppen og høj proteinudskillelse i urinen), skader på nyrevæv.
- nedsat urinmængde eller blod i urinen og/eller overfølsomhedsreaktioner såsom feber, udslæt og ledstivhed (tubulointerstitiel nefritis)
- alvorlig nedsat urinmængde (tegn på nyrenekrose).

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

- lægemidler som Diclofenac rapid Teva kan være forbundet med en let øget risiko for hjertetilfælde eller slagtilfælde.
- en allergisk hudreaktion, der kan omfatte runde eller ovale røde pletter og hævelse af huden, blæredannelse og kløe (erythema fixum). Mørkfarvning af huden i de berørte områder, som kan vare ved efter helingen, kan også forekomme. Erythema fixum indtræder sædvanligvis igen på samme sted(er), hvis lægemidlet tages igen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diclofenac rapid Teva indeholder:

- Det aktive stof er diclofenackalium. En tablet indeholder 50 mg diclofenackalium.
- De øvrige indholdsstoffer er mikrokrySTALLinsk cellulose, lactosemonohydrat, majsstivelse, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica, hypromellose, glycerol 85 %, talcum, titandioxid (E171), rød og gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Diclofenac rapid Teva er en rødbrun, rund, bikonveks filmovertrukket tablet med en diameter på 11,1 mm.

Diclofenac rapid Teva fås i følgende pakningsstørrelser: 10, 20, 20x1, 30, 50, 50 x1, 100, 100x1 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Holland

Repræsentant:

Teva Denmark A/S
Vandtårnsvej 83A
2860 Søborg
Tlf.: 44 98 55 11
E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller:

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Str. 3
D-89143 Blaubeuren
Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i medlemslandene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde under følgende navne:

Danmark:	Diclofenac rapid Teva
Finland:	Diclomex Rapid 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Sverige:	Diclofenac T ratiopharm tablett 50 mg
Østrig:	Diclobene rapid 50 mg - Filmtabletten

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2025.