

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cytisiniclin 2care4 1,5 mg tabletter

cytisin

01-2025
P180496-1

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cytisiniclin 2care4
3. Sådan skal du tage Cytisiniclin 2care4
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Rygestop og nedsættelse af nikotinrang hos rygere, som ønsker at holde op med at ryge. Målet med behandling med Cytisiniclin 2care4 er permanent stop af brug af nikotinholdige produkter.

Brugen af Cytisiniclin 2care4 muliggør en gradvis reduktion af nikotinafhængighed via lindring af abstinenssymptomer.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cytisiniclin 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Cytisiniclin 2care4

- hvis du er allergisk over for cytisin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cytisiniclin 2care4 (angivet i afsnit 6),
- hvis du har ustabil angina (smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen),
- hvis du har en historik med nyligt myokardieinfarkt (åndenød, angst, brystmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet),
- hvis du har klinisk signifikant dysrytmi (unormal hjerterytme),
- hvis du for nylig har haft et slagtilfælde,
- hvis du er gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Cytisiniclin 2care4.

Cytisiniclin 2care4 skal bruges med forsigtighed i forbindelse med iskæmisk hjertelidelse (iltmangel betinget hjertelidelse), hjertefejl, hypertension (højt blodtryk), phæochromocytom (en binyretumor), aterosklerose (hærdning af arterierne; åreforkalkning) og andre perifere vaskulære sygdomme (hjertekarsygdomme), mavesår og ulcus duodeni (beskadiget slimhinde i maven og tolvfingertarmen), gastroøsofageal reflux (halsbrand, sure opstød), hyperthyreoidisme (overaktiv skjoldbruskkirtel), diabetes, skizofreni, nyre- og leverfejl.

Cytisiniclin 2care4 bør kun tages af personer, som har til hensigt at blive fravænet nikotin. Brugen af Cytisiniclin 2care4 og fortsat rygning kan medføre alvorlige nikotinrelaterede bivirkninger.

Børn og unge

På grund af begrænset anvendelseserfaring er Cytisiniclin 2care4 ikke anbefalet til brug hos personer under 18 år.

Ældre mennesker

På grund af begrænset klinisk anvendelseserfaring er Cytisiniclin 2care4 ikke anbefalet til brug hos personer over 65 år.

Patienter med nyre- og leversygdomme

Der er ingen klinisk anvendelseserfaring med brug af Cytisiniclin 2care4 hos patienter med nyre- eller leversygdomme, og derfor anbefales lægemidlet ikke til brug hos disse patienter.

Brug af andre lægemidler sammen med Cytisiniclin 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.

Undgå at tage Cytisiniclin 2care4 sammen med antituberkulose lægemidler.

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at justere doseringen af andre lægemidler, når man holder op med at ryge, uanset om man tager Cytisiniclin 2care4 eller ej. Dette er særligt vigtigt, hvis du tager andre lægemidler, som indeholder theophyllin (mod astma), tacrin (mod Alzheimers sygdom), clozapin (mod skizofreni) og ropinirol (mod Parkinsons syge). Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du er i tvivl.

Det vides ikke om Cytisiniclin 2care4 kan mindske effekten af hormonelle præventionsmidler. Hvis du anvender et hormonelt præventionsmiddel, skal du også beskytte dig på anden vis (f.eks. kondom).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker prævention under behandling med Cytisiniclin 2care4. Spørg din læge til råds.

Cytisiniclin 2care4 må ikke anvendes under graviditet og amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cytisiniclin 2care4 har ingen indflydelse på evnen til at køre bil og betjene maskiner.

Rygestop

Effekten af de ændringer, der sker i din krop i forbindelse med rygestop, med eller uden behandling med Cytisiniclin 2care4, kan ændre den måde, som andre lægemidler fungerer på. Derfor kan det være nødvendigt at justere dosis. Se ovenfor under 'Brug af andre lægemidler sammen med Cytisiniclin 2care4' for yderligere oplysninger.

Hos visse personer har det at holde op med at ryge, med eller uden behandling, været associeret med en øget risiko for ændringer i tankemønstre eller adfærd, depression og angst (sjældent, men herunder selvmordstanker og selvmordsforsøg) og kan associeres med en forværring af psykisk sygdom. Hvis du tidligere har haft en psykisk sygdom, skal du tale med din læge om dette.

3. Sådan skal du tage Cytisiniclin 2care4

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. En pakke Cytisiniclin 2care4 (100 tabletter) er nok til en komplet behandling. Behandlingen varer i 25 dage.

Cytisiniclin 2care4 skal indtages oralt og sammen med en passende mængde vand i henhold til følgende plan.

Behandlingsdage	Anbefalet dosering	Maks. daglig dosis
Fra den 1. til den 3. dag	1 tablet hver anden time	6 tabletter
Fra den 4. til den 12. dag	1 tablet hver 2,5 time	5 tabletter
Fra den 13. til den 16. dag	1 tablet hver 3 time	4 tabletter
Fra den 17. til den 20. dag	1 tablet hver 5 time	3 tabletter
Fra den 21. til den 25. dag	1-2 tabletter om dagen	2 tabletter

Rygstoppet skal indtræde senest på behandlingens femte dag. Rygning må ikke fortsættes under behandlingen, da dette kan forværre bivirkningerne. Ved manglende virkning af behandlingen skal behandlingen afbrydes og genoptages efter 2 til 3 måneder.

Hvis du har taget for meget Cytisiniclin 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Cytisiniclin 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer på nikotinforgiftning kan observeres ved overdosering af Cytisiniclin 2care4. Symptomer på overdosering omfatter utilpashed, kvalme, opkast, øget hjertefrekvens, udsving i blodtryk, åndedrætsproblemer, sløret syn, krampes.

Hvis du har ét af de beskrevne symptomer eller et symptom, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, skal du stoppe med at tage Cytisiniclin 2care4 og kontakte din læge eller apoteket.

Hvis du har glemt at tage Cytisiniclin 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Cytisiniclin 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

ændret appetit (oftest øget appetit), vægtstigning, svimmelhed, irritabilitet, humørsvingninger, angst, øget blodtryk (hypertension), tør mund, diarre, udslæt, udmattelse, søvnproblemer (søvnløshed, døsighed, sløvhed, unormale drømme, mareridt), hovedpine, øget hjertefrekvens, kvalme, smagsændringer, halsbrand, forstoppelse, opkast, mavesmerter (særligt i den øverste del af maven), muskelsmerter.

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

koncentrationsbesvær, lav hjertefrekvens, abdominal udspiling, brændende tunge, utilpashed.

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

fornemmelse af et tungt hoved, reduceret libido (nedsat sexlyst), øget spytdannelse, overdreven spytdannelse, svedeture, reduceret hudelasticitet, træthed, stigning i serumtransaminaseniveauer.

Sjældne bivirkninger: (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

grådlabil.

De fleste af ovenstående bivirkninger optræder i starten af behandlingen og mildnes i behandlingens varighed. Disse symptomer kan også være resultatet af ryggestop (nedtrapningssymptomer), ikke behandling med Cytisiniclin 2care4.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares ved temperaturer under 25 °C.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt og lys.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cytisiniclin 2care4 indeholder:

- Aktivt stof: cytisin. 1 tablet indeholder 1,5 mg cytisin.
- Øvrige indholdsstoffer: mannitol, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, glyceroldibehenat, hypromellose.

Udseende og pakningsstørrelser

Cytisiniclin 2care4 er en rund, bikonveks, hvid tablet med en diameter på 6 mm.

Blisterpakninger placeret i en æske med 100 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

Dextazin® er et registreret varemærke, der tilhører Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2025.