

## Indlægsseddel: Information til brugeren

### Vermox 20 mg/ml, oral suspension

mebendazol

- **Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.** Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Vermox til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk).

#### Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vermox
3. Sådan skal du tage Vermox
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

#### 1. Virkning og anvendelse

Vermox (mebendazol) er et ormemiddel, der virker mod flere typer af indvoldsorm. Vermox dræber voksne orm, larver og æg fra spolorm, piskeorm og hageorm, men ikke æg fra børneorm.

Du kan tage Vermox, hvis du har børneorm, spolorm, piskeorm eller hageorm.

#### 2. Det skal du vide før du begynder at tage Vermox

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning, og oplysningerne på doseringsetiketten.

#### Tag ikke Vermox

- hvis du er allergisk over for mebendazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Vermox (angivet i afsnit 6).

#### Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Vermox. Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Vermox. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

#### Børn og unge

Der er rapporteret krampeanfald, herunder hos spædbørn. Vermox må kun gives til børn under 2 år, hvis lægen specifikt har ordineret det.

#### Brug af andre lægemidler sammen med Vermox

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod

- mavesår, sure opstød eller spiserørskatar (cimetidin).
- infektioner (metronidazol)

### **Brug af Vermox sammen med mad og drikke**

Du kan tage Vermox i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

### **Graviditet og amning**

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

#### Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Vermox efter aftale med lægen.

#### Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Vermox efter aftale med lægen.

### **Trafik- og arbejdssikkerhed**

Vermox påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

### **Vermox indeholder methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), saccharose og natrium**

- Methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216) kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).
- Saccharose. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
- Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. ml, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.

## **3. Sådan skal du tage Vermox**

Tag altid Vermox nøjagtigt efter lægens, apotekspersonalets eller sygeplejerskens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken.

Det er vigtigt at have en god hygiejne for at få den bedste virkning af behandlingen. Det er især vigtigt, at hele familien vasker hænder efter hvert toiletbesøg og før enhver form for fødeindtagelse.

Vermox oral suspension skal overvejes til patienter såsom mindre børn, som ikke er i stand til at sluge tableten.

Vermox må kun gives til børn under 2 år, hvis lægen specifikt har ordineret det.

### **Den anbefalede dosis er**

#### **Børneorm**

Voksne og børn: 5 ml suspension som enkeltdosis. Da der ofte opstår fornyet smitte, skal behandlingen gentages efter 2 og 4 uger for at sikre at ormene er helt væk. Følg lægens anvisninger.

#### **Spolorm, piskeorm og hageorm samt ved forekomst af flere slags indvoldsorm**

Voksne og børn: 5 ml 2 gange daglig i 3 dage.

### **Brugervejledning**

- Træk doseringsbægeret af skruelåget.
- Ryst flasken.
- Det børnesikrede låg skrues af ved at trykke skruelåget ned (1).
- Derefter skal du dreje skruelåget mod uret (2), mens du holder det nede.
- Hæld den orale suspension op i doseringsbægeret.



- Skru låget fast på flasken efter brug og rengør doseringsbægeret.

Suspensionen skal indtages med det målebæger der medfølger. Målebæget kan være på 5 ml eller 10 ml. Se omhyggeligt på målebægerets graduering, før du doserer produktet.

#### **Ved nedsat nyre- og leverfunktion:**

Det er normalt ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

#### **Hvis du har taget for meget Vermox oral suspension**

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Vermox oral suspension, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag emballagen med.

Hvis du har taget for meget oral suspension, kan du få mavekramper, kvalme, opkastning og diaré.

#### **Hvis du har glemt at tage Vermox**

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det.

#### **Hvis du holder op med at tage Vermox**

Kontakt lægen, hvis du ønsker at stoppe eller afbryde behandlingen med Vermox. For at få et godt resultat er det vigtigt, at du gennemfører hele behandlingen.

Kontakt straks lægen, hvis du igen får tegn på, at du har orm, efter behandlingen med Vermox er stoppet.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

## **4. Bivirkninger**

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

### **Alvorlige bivirkninger**

**Sjældne bivirkninger:** Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Kramper er forekommet – også hos spædbørn. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden, ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
- Kraftig afskalning og afstødning af huden. Kontakt læge eller skadestue.
- Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
- Nyrebetændelse og kraftigt nedsat antal hvide blodlegemer kan forekomme med længere tids brug af Vermox ved doser, som er betragteligt højere end de anbefalede (meget mere end normalt ordineret). Kontakt læge eller skadestue.

### **Ikke alvorlige bivirkninger**

**Almindelige bivirkninger:** Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter

- Mavesmerter.

**Ikke almindelige bivirkninger:** Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter

- Ubehag i maven, diarré, luftafgang fra tarmen, kvalme, opkastning.

**Sjældne bivirkninger:** Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter

- Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner), især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte læge eller skadestue.
- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Det kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af tunge, læber og ansigt, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Hårtab.
- Svimmelhed.

Vermox kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver for leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

### **Indberetning af bivirkninger**

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen  
Axel Heides Gade 1  
DK-2300 København S  
Websted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

## **5. Opbevaring**

Opbevar Vermox utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Tag ikke Vermox efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

## **6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger**

### **Vermox 20 mg/ml oral suspension indeholder:**

- Aktivt stof: Mebendazol.
- Øvrige indholdsstoffer: Saccharose, mikrokrySTALLinsk cellulose, carmellosenatrium, methylcellulose, methylparahydroxybenzoat (E218), natriumlaurilsulfat, propylparahydroxybenzoat (E216), bananessens, citronsyremonohydrat og renset vand.

### **Udseende og pakningsstørrelser**

Vermox suspension er en uigennemsigtig hvid oral suspension med banansmag tilgængelig i 30 ml pakninger med et målebæger. Målebægeret kan være på 5 ml som viser en graduering på 2,5 ml og 5 ml eller på 10 ml som viser en graduering på 5 ml og 10 ml.

Vermox oral suspension skal omrystes inden brug og er efter omrystning en hvid, ensartet mikstur.

Flaske med 30 ml

### **Indehaver af markedsføringstilladelsen**

McNeil Denmark ApS

Transformervej 14  
DK-2860 Søborg  
[consumer-dk@kenvue.com](mailto:consumer-dk@kenvue.com)

**Fremstiller**

Janssen Pharmaceutica N.V.  
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse  
Belgien

eller

Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica S.A.  
Estrada Consiglieri Pedroso 66, 69-B,  
2730-055 Barcarena,  
Portugal

**Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2025.**