

Indlægsseddel: Information til patienten

Dabigatran etexilate Krka 75 mg hårde kapsler

dabigatranetexilat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dabigatran etexilate Krka
3. Sådan skal du tage Dabigatran etexilate Krka
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dabigatran etexilate Krka indeholder det aktive stof dabigatranetexilat, og hører til en gruppe lægemidler, der kaldes antikoagulantia (blodfortyndende lægemidler). Det virker ved at blokere for et stof i kroppen, som er involveret i dannelsen af blodpropper.

Dabigatran etexilate Krka anvendes til voksne for at:

- forebygge dannelsen af blodpropper i venerne efter udskiftning af knæ eller hofte.

Dabigatran etexilate Krka anvendes til børn for at:

- behandle blodpropper samt forebygge nye blodpropper.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dabigatran etexilate Krka

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Dabigatran etexilate Krka

- hvis du er allergisk over for dabigatranetexilat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dabigatran etexilate Krka (angivet i punkt 6).
- hvis du har svært nedsat nyrefunktion.
- hvis du aktuelt bløder.
- hvis du har en sygdom i et af dine organer, som øger risikoen for alvorlig blødning (f.eks. mavesår, skade eller blødning i hjernen, en nylig operation i hjernen eller øjnene).
- hvis du har øget tendens til at bløde. Denne kan være medfødt, have ukendte årsager eller skyldes andre lægemidler.

- hvis du tager andre lægemidler til at forebygge blodpropper (f.eks. warfarin, rivaroxaban, apixaban eller heparin) bortset fra ved skift til andre blodfortyndende lægemidler, hvis du samtidig har et venekateter eller arteriekateter, og du får heparin i det kateter for at holde det åbent eller mens dit hjerteslag vender tilbage til normalen ved en procedure kaldet kateterablation for atrieflimren.
- hvis du har svært nedsat leverfunktion eller en leversygdom, som kan være livstruende.
- hvis du tager oral ketoconazol eller itraconazol, som er lægemidler til behandling af svampeinfektioner.
- hvis du tager oral ciclosporin, som er et lægemiddel til forebyggelse af organafstødning efter transplantation.
- hvis du tager dronedaron, som er et lægemiddel til behandling af en unormal hjerterytme.
- hvis du tager et kombinationspræparat med glecaprevir og pibrentasvir, et antiviralt lægemiddel, der anvendes til at behandle hepatitis C.
- hvis du har en kunstig hjerteklap, der kræver permanent blodfortynding.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Dabigatran etexilate Krka. Det kan også være nødvendigt at kontakte lægen, mens du er i behandling med Dabigatran etexilate Krka, hvis du får symptomer, eller hvis du skal opereres.

Fortæl det til din læge, hvis du har eller har haft en medicinsk tilstand eller sygdom, især dem, der er nævnt i den følgende liste:

- hvis du har en øget risiko for blødninger, såsom:
 - hvis du har haft en blødning for nylig.
 - hvis du har fået taget et stykke væv ud (en biopsi) i løbet af den sidste måned.
 - hvis du har haft en alvorlig skade (f.eks. knoglebrud, kvæstelse i hovedet eller en skade, der har krævet operation).
 - hvis du lider af en betændelseslignende tilstand i spiserøret eller maven.
 - hvis du har problemer med tilbageløb af mavesaft til spiserøret.
 - hvis du får lægemidler, der kan øge risikoen for blødning. Se 'Brug af andre lægemidler sammen med Dabigatran etexilate Krka' nedenfor.
 - hvis du tager antiinflammatoriske lægemidler, såsom diclofenac, ibuprofen, piroxicam.
 - hvis du har en betændelsestilstand i hjertet (bakteriel endocardit).
 - hvis du ved, at du har nedsat nyrefunktion eller du lider af dehydrering (symptomer omfatter tørstfornemmelse og en reduceret mængde mørkfarvet (koncentreret)/skummende urin).
 - hvis du er over 75 år.
 - hvis du er voksen og vejer 50 kg eller mindre.
 - kun, hvis det anvendes til børn: hvis barnet har en infektion rundt om eller i hjernen.
- hvis du har haft et hjerteanfald, eller du er blevet diagnosticeret med sygdomme, som øger risikoen for at få et hjerteanfald.
- hvis du har en leversygdom, som er forbundet med en påvirkning af blodprøveresultater. Hvis det er tilfældet, kan brugen af Dabigatran etexilate Krka ikke anbefales.

Vær særlig forsigtig med Dabigatran etexilate Krka

- hvis du har behov for en operation:

I dette tilfælde skal behandling med Dabigatran etexilate Krka midlertidigt stoppes, da der er en øget risiko for blødning under og kort efter en operation. Det er meget vigtigt at tage Dabigatran etexilate Krka før og efter operationen nøjagtigt på de tidspunkter, som du har fået fortalt af lægen.
- hvis en operation involverer et kateter eller en injektion i rygmarven (f.eks. for epidural eller spinal anæstesi eller smertelindring):
 - det er meget vigtigt at tage Dabigatran etexilate Krka før og efter operationen nøjagtigt på de tidspunkter, som du har fået fortalt af lægen.
 - fortæl det straks til lægen, hvis dine ben bliver følelseløse eller svage, eller du får problemer med tarmen eller blæren efter endt anæstesi, da det er nødvendigt med akut behandling.

- hvis du falder eller kommer til skade, især hvis du slår hovedet, skal du straks søge lægehjælp. Det kan være nødvendigt, at du bliver undersøgt af en læge, da du kan have en øget risiko for blødning.
- hvis du ved, at du har en sygdom, der hedder antifosfolipidsyndrom (en forstyrrelse i immunsystemet, der giver øget risiko for blodpropper), skal du sige det til lægen, som vil vurdere, om behandlingen skal ændres.

Brug af andre lægemidler sammen med Dabigatran etexilate Krka

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler. **Fortæl det især til lægen, før du tager Dabigatran etexilate Krka, hvis du tager et af de nedenstående lægemidler:**

- Lægemidler, der mindsker blodets evne til at størkne (f.eks. warfarin, phenprocoumon, acenocoumarol, heparin, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, rivaroxaban, acetylsalicylsyre).
- Lægemidler til behandling af svampeinfektioner (f.eks. ketoconazol, itraconazol), bortset fra lægemidler til brug på huden.
- Lægemidler til behandling af uregelmæssig hjerterytme (f.eks. amiodaron, dronedaron, kinidin, verapamil).
Hvis du tager lægemidler, der indeholder amiodaron, kinidin eller verapamil, kan lægen fortælle dig, at du skal bruge en reduceret dosis af Dabigatran etexilate Krka, afhængigt af sygdommen, som du har fået ordineret Dabigatran etexilate Krka mod. Se også punkt 3.
- Lægemidler til forebyggelse af organafstødning efter transplantation (f.eks. tacrolimus eller ciclosporin).
- Et kombinationspræparat med glecaprevir og pibrentasvir (et antiviralt lægemiddel, der anvendes til at behandle hepatitis C).
- Antiinflammatoriske og smertelindrende lægemidler (f.eks. acetylsalicylsyre, ibuprofen, diclofenac).
- Perikon, et naturlægemiddel, som bruges mod depression.
- Lægemidler mod depression, der kaldes selektive serotonin-genoptagelseshæmmere eller serotonin-noradrenalin-genoptagelseshæmmere.
- Rifampicin eller clarithromycin (to antibiotika).
- Antivirale lægemidler mod aids (f.eks. ritonavir).
- Visse former for lægemidler til behandling af epilepsi (f.eks. carbamazepin, phenytoin).

Graviditet og amning

Virningen af Dabigatran etexilate Krka på graviditet og et ufødt barn kendes ikke. Du må ikke tage Dabigatran etexilate Krka, hvis du er gravid, medmindre din læge siger, at det er sikkert nok for dig. Hvis du er kvinde i den fødedygtige alder, bør du undgå graviditet, mens du tager Dabigatran etexilate Krka.

Du må ikke amme, mens du tager Dabigatran etexilate Krka.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dabigatran etexilate Krka påvirker ikke evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

3. Sådan skal du tage Dabigatran etexilate Krka

Dabigatran etexilate Krka kan anvendes til voksne og børn i alderen 8 år eller ældre, som kan sluge kapslerne hele.

Der er andre aldersrelevante dosisformer til behandling af børn under 8 år.

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg.

Tag Dabigatran etexilate Krka som anbefalet herunder for de forskellige indikationer:

Forebyggelse af dannelse af blodpropper efter udskiftning af knæ eller hofte

Den anbefalede dosis er **220 mg én gang dagligt** (taget som 2 kapsler på 110 mg).

Hvis din **nyrefunktion er nedsat** til mindre end det halve, eller hvis du er **75 år eller ældre**, er den anbefalede dosis **150 mg én gang dagligt** (taget som 2 kapsler på 75 mg).

Hvis du tager lægemidler, der indeholder **amiodaron, kinidin eller verapamil**, er den anbefalede dosis **150 mg én gang dagligt** (taget som 2 kapsler på 75 mg).

Hvis du tager **lægemidler, der indeholder verapamil, og du har en nedsat nyrefunktion** med mere end halvdelen, bør du behandles med en reduceret dosis på **75 mg Dabigatran etexilate Krka**, fordi din risiko for blødning kan være øget.

Ved begge slags operationer er det sådan, at behandlingen ikke påbegyndes, hvis det stadig bløder fra operationssåret. Hvis behandlingen først kan begynde dagen efter operationen, skal du begynde doseringen med at tage 2 kapsler én gang dagligt.

Efter udskiftning af knæ

Du skal begynde behandlingen med Dabigatran etexilate Krka, inden for 1-4 timer efter operationen er afsluttet, med 1 kapsel. Derefter skal du tage 2 kapsler én gang dagligt i totalt 10 dage.

Efter udskiftning af hofte

Du skal begynde behandlingen med Dabigatran etexilate Krka, inden for 1-4 timer efter operationen er afsluttet, med 1 kapsel. Derefter skal du tage 2 kapsler én gang dagligt i totalt 28-35 dage.

Behandling af blodpropper samt forebyggelse af nye blodpropper hos børn

Dabigatran etexilate Krka skal tages 2 gange dagligt, én dosis om morgenen og én dosis om aftenen, på omtrent samme tidspunkt hver dag. Intervallet mellem doseringer skal være så tæt på 12 timer som muligt.

Den anbefalede dosis afhænger af vægt og alder. Din læge vil bestemme den korrekte dosis. Din læge kan justere dosis i løbet af behandlingen. Bliv ved med at bruge alle andre lægemidler, medmindre lægen beder dig om at stoppe brugen af nogen af dem.

Tabel 1 viser den enkelte og den samlede daglige dosis Dabigatran etexilate Krka i milligram (mg). Doserne afhænger af patientens vægt i kilo (kg) og alder i år:

Tabel 1: Doseringstabel for Dabigatran etexilate Krka kapsler

Vægt-/alderskombinationer		Enkeltdosis i mg	Samlet daglig dosis i mg
Vægt i kg	Alder i år		
11 til under 13 kg	8 til under 9 år	75	150
13 til under 16 kg	8 til under 11 år	110	220
16 til under 21 kg	8 til under 14 år	110	220
21 til under 26 kg	8 til under 16 år	150	300
26 til under 31 kg	8 til under 18 år	150	300
31 til under 41 kg	8 til under 18 år	185	370

41 til under 51 kg	8 til under 18 år	220	440
51 til under 61 kg	8 til under 18 år	260	520
61 til under 71 kg	8 til under 18 år	300	600
71 til under 81 kg	8 til under 18 år	300	600
81 kg eller derover	10 til under 18 år	300	600

Enkeldoser, der kræver kombinationer af flere end én kapsel:

- 300 mg: to 150 mg kapsler eller
fire 75 mg kapsler
- 260 mg: én 110 mg plus én 150 mg kapsel eller
én 110 mg plus to 75 mg kapsler
- 220 mg: som to 110 mg kapsler
- 185 mg: som én 75 mg plus én 110 mg kapsel
- 150 mg: som én 150 mg kapsel eller
to 75 mg kapsler

Sådan skal du tage Dabigatran etexilate Krka



Dabigatran etexilate Krka kan tages sammen med eller uden mad. Slug kapslen hel med et glas vand for at lette passagen til mavesækken. Lad være med at dele eller tygge kapslen eller tage indholdet ud, da det kan øge blødningsrisikoen.

Anvisninger i at åbne blisterne

Følgende piktogram viser, hvordan du skal tage kapslerne med Dabigatran etexilate Krka ud af blisteren.

Sådan tages kapslen ud af blisteren:

1. Hold på blisterens kanter og adskil en blisterlomme fra resten af blisterkortet ved forsigtigt at bøje og rive langs perforeringen omkring den.
 2. Træk op i kanten af foliet og træk foliet helt af.
 3. Vend kapslen ud i hånden.
 4. Slug kapslen hel sammen med et glas vand.
- Tryk ikke kapslen gennem blisterfolien.
 - Træk først folien af, når der er behov for en kapsel.



Anvisninger for beholderen

- Tryk låget ned og drej for at åbne.
- Når du har taget kapslen ud, skal låget sættes på beholderen igen, og straks efter du har taget din dosis, skal beholderen lukkes tæt til.

Skift i blodfortyndende behandling

Skift ikke blodfortyndende behandling, uden specifik rådgivning fra lægen.

Hvis du har taget for meget Dabigatran etexilate Krka

Kontakt omgående lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere af Dabigatran etexilate Krka, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Hvis du har taget for meget af Dabigatran etexilate Krka, øges risikoen for blødning. Specifikke behandlingsmuligheder er tilgængelige.

Hvis du har glemt at tage Dabigatran etexilate Krka

Forebyggelse af dannelse af blodpropper efter udskiftning af knæ eller hofte

Fortsæt næste dag med dine resterende daglige doser Dabigatran etexilate Krka på samme tidspunkt, som du plejer. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Behandling af blodpropper samt forebyggelse af nye blodpropper hos børn

En glemt dosis kan stadig tages op til 6 timer før næste dosis skal tages.

En glemt dosis skal udelades, hvis den resterende tid, før næste dosis skal tages, er under 6 timer.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Dabigatran etexilate Krka

Tag Dabigatran etexilate Krka nøjagtigt som foreskrevet. Du må ikke holde op med at tage Dabigatran etexilate Krka uden først at tale med lægen, da risikoen for at udvikle en blodprop kan være større, hvis du stopper for tidligt med behandlingen. Kontakt lægen, hvis du oplever fordøjelsesbesvær, efter du har taget Dabigatran etexilate Krka.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Dabigatran etexilate Krka virker på blodets størkning, så de fleste bivirkninger er tegn på blå mærker eller blødninger.

Alvorlig eller svær blødning kan forekomme, de udgør de mest alvorlige bivirkninger og kan, uafhængigt af, hvor blødningen forekommer, være invaliderende, livstruende eller endog med dødelig udgang. Sådanne blødninger er ikke altid synlige.

Kontakt straks lægen, hvis du får en blødning, som ikke stopper af sig selv eller der opstår tegn på længerevarende eller kraftig blødning (usædvanlig svaghed, træthed, bleghed, svimmelhed, hovedpine eller uforklarlig hævelse). Din læge kan i så fald beslutte at holde dig under nøje observation eller ændre dine lægemidler.

Kontakt straks lægen, hvis du får en alvorlig allergisk reaktion, som medfører vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed.

De nedenfor anførte mulige bivirkninger er grupperet efter, hvor ofte de kan forekomme.

Forebyggelse af dannelse af blodpropper efter udskiftning af knæ eller hofte

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

- Nedsat indhold af hæmoglobin i blodet (substans i de røde blodlegemer).
- Unormale laboratorietestresultater for leverfunktionen.

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

- Blødning kan forekomme fra næsen, i maven eller tarmen, fra penis/vagina eller urinvejene (inkl. blod i urinen, der farver urinen pink eller rød), fra hæmorider, fra endetarmen, under huden, i led, fra eller efter et uheld, eller efter en operation.
- Blodansamling eller blå mærker efter en operation.
- Blod i afføringen fundet ved laboratorieanalyse.
- Nedsat antal røde blodlegemer.
- Fald i andelen af blodlegemer.
- Allergisk reaktion.
- Opkastning.
- Hyppig løs eller vandig afføring.
- Kvalme.
- Sårsekret (udsivning af væske fra operationssåret).
- Stigning i leverenzymmer.
- Gulfarvning af huden eller af det hvide i øjnene på grund af lever- eller blodproblemer.

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

- Blødning.
- Blødning kan forekomme i hjernen, fra operationssnittet, fra et injektionssted eller fra det sted, hvor et kateter går ind i en vene.
- Blodigt udflåd fra det sted, hvor et kateter går ind i en vene.
- Ophostning af blod eller blodigt sput.
- Nedsat antal blodplader.
- Nedsat antal røde blodlegemer efter en operation.
- Alvorlig allergisk reaktion, som medfører vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed.
- Alvorlig allergisk reaktion, som medfører hævelser i ansigtet eller svælget.
- Hududslæt fremtrædende som mørkerøde, hævede, kløende buler forårsaget af en allergisk reaktion.
- Pludselig ændring af hudens farve og udseende.
- Kløe.
- Mavesår eller sår i tarmen (inkl. sår i spiserøret).
- Betændelseslignende tilstand i spiserøret og maven.
- Tilbageløb af mavesaft til spiserøret.
- Mavesmerter.
- Fordøjelsesbesvær.
- Synkebesvær.
- Sårvæske.
- Sårvæske efter en operation.

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke beregnes ud fra de tilgængelige data):

- Vejrtrækningsbesvær eller hvæsende vejrtrækning.
- Nedsat antal af eller endog mangel på hvide blodlegemer (disse hjælper med at bekæmpe infektioner).
- Hårtab.

Behandling af blodpropper samt forebyggelse af nye blodpropper hos børn

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

- Nedsat antal røde blodlegemer.
- Nedsat antal blodplader.
- Hududslæt fremtrædende som mørkerøde, hævede, kløende buler forårsaget af en allergisk reaktion.
- Pludselig ændring af hudens farve og udseende.
- Blodansamling.
- Næseblod.
- Tilbageløb af mavesaft til spiserøret.

- Opkastning.
- Kvalme.
- Hyppig løs eller vandig afføring.
- Fordøjelsesbesvær.
- Hårtab.
- Stigning i leverenzzymer.

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

- Nedsat antal hvide blodlegemer (disse hjælper med at bekæmpe infektioner).
- Blødning kan forekomme i maven eller tarmen, fra hjernen, fra endetarmen, fra penis/vagina eller urinvejene (inkl. blod i urinen, der farver urinen pink eller rød) eller under huden.
- Nedsat indhold af hæmoglobin i blodet (substans i de røde blodlegemer).
- Fald i andelen af blodlegemer.
- Kløe.
- Ophostning af blod eller blodigt sput.
- Mavesmerter.
- Betændelseslignende tilstand i spiserøret og maven.
- Allergisk reaktion.
- Synkebesvær.
- Gulfarvning af huden eller af det hvide i øjnene på grund af lever- eller blodproblemer.

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke beregnes ud fra de tilgængelige data):

- Mangel på hvide blodlegemer (disse hjælper med at bekæmpe infektioner).
- Alvorlig allergisk reaktion, som medfører vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed.
- Alvorlig allergisk reaktion, som medfører hævelser i ansigtet eller svælget.
- Vejrtrækningsbesvær eller hvæsende vejrtrækning.
- Blødning.
- Blødning kan forekomme i et led eller fra et uheld, efter operation, eller fra et injektionssted, eller fra det sted, hvor et kateter går ind i en vene.
- Blødning kan forekomme fra hæmorider.
- Mavesår eller sår i tarmen (inkl. sår i spiserøret).
- Unormale laboratorietestresultater for leverfunktionen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterkortet eller beholderens etiket efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Blisterkort:

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. Opbevares i den originale blisterpakning for at beskytte mod lys og fugt.

Beholder:

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. Opbevares i den originale beholder for at beskytte mod lys og fugt. Hold beholderen tæt tillukket.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dabigatran etexilate Krka indeholder:

- Aktivt stof: Dabigatranetexilat. Hver hård kapsel indeholder 75 mg dabigatranetexilat (som dabigatranetexilatmesilat).
- Øvrige indholdsstoffer: vinsyre, hypromellose, hydroxypropylcellulose og talcum i kapselindholdet.
- Øvrige indholdsstoffer: titandioxid (E171), carrageenan, kaliumchlorid, hypromellose i kapselskallen.
- Øvrige indholdsstoffer: shellac, sort jernoxid (E172), kaliumhydroxid i printblækket.

Udseende og pakningsstørrelser

Dabigatran etexilate Krka 75 mg hårde kapsler: Kapselhætten er hvid til råhvid, kapselunderdelen er hvid til råhvid påtrykt 75 med sort farve i kapslens længderetning, ca. 18 mm lange. Kapselindholdet er gullighvide til lysegule pellets.

Dabigatran etexilate Krka 75 mg hårde kapsler fås i æsker indeholdende:

- 10 x 1, 30 x 1, 60 x 1, 100 x 1 eller multipakninger indeholdende 100 (2 pakninger med 50 x 1) eller 180 (3 pakninger med 60 x 1) hårde kapsler i perforeret enkeltdosis-*peel-off*-blister.
- 60 hårde kapsler i en beholder med børnesikret, anbrudssikret låg
- eller 3 beholdere med 60 hårde kapsler, i beholdere med børnesikret, anbrudssikret låg.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og framstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Repræsentant

KRKA Sverige AB, Götgatan 78, box 24, 118 30 Stockholm, Sverige

Denne indlægsseddel blev senest ændret: 01/2026