

Indlægsseddel: Information til patienten

Mesalazin Orion 1000 mg enterotabletter

mesalazin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mesalazin Orion
3. Sådan skal du tage Mesalazin Orion
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Mesalazin Orion enterotabletter indeholder 1000 mg af det aktive indholdsstof mesalazin (også kendt som 5-aminosalicylsyre), som hører til gruppen af lægemidler der anvendes til behandling af inflammatoriske sygdomme i tyktarmen og endetarmen.

Mesalazin Orion bruges til behandling af ulcerativ colitis, en inflammatorisk tarmsygdom.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mesalazin Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Mesalazin Orion

- hvis du er allergisk over for mesalazin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
- hvis du er allergisk over for acetylsalicylsyre eller andre salicylater
- hvis du har en sygdom, som gør dig mere tilbøjelig til blødning
- hvis du har alvorligt nedsat nyrer- og/eller leverfunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Mesalazin Orion.

Inden behandling med Mesalazin Orion skal du fortælle det til lægen

- hvis du er eller ønsker at blive gravid
- hvis du ammer dit barn
- hvis du har lever- eller nyreproblemer
- hvis du lider af en lungesygdom, som f.eks. astma
- hvis du før har været allergisk overfor sulfasalazin
- hvis du har mavesår eller sår på tarmen

- hvis du tidligere har haft betændelse i hjertet (som kunne skyldes en hjerteinfektion).
- hvis du nogensinde har udviklet et svært hududslæt eller hudafskalning, blæredannelse og/eller mundsår efter at have taget mesalazin.

Hvis du oplever kraftig eller tilbagevendende hovedpine, synsforstyrrelser eller ringen eller summen for ørerne, skal du straks kontakte din læge.

I tilfælde af allergisk reaktion (f.eks. udslæt, kløe) eller kramper, mavesmerter, svær hovedpine og feber under behandlingen, skal du ikke tage flere tabletter og straks fortælle det til din læge.

Før og under behandlingen tager din læge muligvis regelmæssige blod- og urinprøver for at kontrollere funktionen af din lever, nyrer, blod og lunger.

Der kan udvikles nyresten ved anvendelse af mesalazin. Symptomerne kan være smerter i siden af maven og blod i urinen. Sørg for at drikke tilstrækkeligt med væske under behandling med mesalazin.

Der er rapporteret om alvorlige hudreaktioner, herunder lægemiddelreaktionen eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), Stevens-Johnsons syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN), i forbindelse med mesalazin-behandling. Stop med at bruge mesalazin og søg lægehjælp med det samme, hvis du bemærker et eller flere symptomer på de alvorlige hudreaktioner, der er beskrevet i afsnit 4.

Mesalazin kan forårsage rød-brun misfarvning af urinen efter kontakt med blegemidler indeholdende natriumhypoklorit i toilet vandet. Det drejer sig om en kemisk reaktion mellem mesalazin og blegemidlet og er harmløst.

Børn og unge

Der er kun begrænset information omkring sikkerheden ved brugen af dette lægemiddel til børn og unge.

Må ikke bruges til børn under 5 år.

Brug af andre lægemidler sammen med Mesalazin Orion

Generelt kan du fortsætte behandling med andre lægemidler, mens du tager Mesalazin Orion. Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.

Mesalazin Orion kan interagere med nogle lægemidler, hvis de gives samtidig.

Særligt:

- lægemidler, der sænker blodsukker (antidiabetika)
- lægemidler, der sænker blodtrykket (antihypertensiva/diuretika)
- lægemidler til behandling eller forebyggelse af urinsyre-gigt-anfald
- lægemidler, der hjælper med afføringen (afføringsmidler indeholdende lactulose)
- lægemidler, der forebygger blodpropper (antikoagulantia)
- lægemidler, der hæmmer immunsystemets aktivitet (f.eks. azathioprin eller 6-mercaptopurin eller thioguanin)
- lægemidler til behandling af smerte og inflammation (antiinflammatoriske lægemidler).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Der er begrænset erfaring med brugen af mesalazin under graviditet og amning. Spædbarnet kan udvikle allergiske reaktioner efter amning, f.eks. diarré. Hvis spædbarnet udvikler diarré bør amningen ophøre.

Kvinder, der er gravide eller ammer, bør ikke tage Mesalazin Orion medmindre de er blevet rådgivet til det af deres læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mesalazin Orion påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Mesalazin Orion indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 4,26 mmol (eller 98 mg) natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr. enterotablet. Dette svarer til 5 % af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for en voksen.

Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du skal tage 4 enterotabletter dagligt i længere tid, især hvis du er blevet rådet til at følge en diæt med lavt saltindhold (natrium).

3. Sådan skal du tage Mesalazin Orion

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Din læge vil fortælle dig hvor længe du skal behandles med dette lægemiddel. Stop ikke med behandlingen tidligt, selv hvis du får det bedre, fordi symptomer kan komme tilbage hvis du stopper behandlingen for tidligt.

Følg din læges behandlingsinstrukser nøje, både i den akutte inflammatoriske fase og i vedligeholdelsesfasen.

Den sædvanlige dosis er:

Til behandling af **episoder af akut colitis** vil din læge sædvanligvis udskrive en dosis på mellem 1,5 (én 1000 mg tablet og én 500 mg tablet) og 4 g (fire 1000 mg tabletter) mesalazin om dagen, hvilket kan gives én gang om dagen eller fordeles på flere doser.

Til **forebyggelse af flere episoder** kan din læge udskrive en dosis på mellem 1,5 (én 1000 mg tablet og én 500 mg tablet) og 3 g (tre 1000 mg tabletter) mesalazin om dagen, hvilket kan gives én gang om dagen eller fordeles på flere doser.

Mesalazin Orion enterotabletter skal tages oralt (via munden).

Tabletterne skal synkes hele, med væske og før et måltid. Må ikke deles, tygges eller knuses.

I begge tilfælde, kan din læge udskrive Mesalazin Orion 500 mg enterotabletter for at justere dosis.

Brug til børn og unge

Det anbefales ikke at give Mesalazin Orion til børn og unge under 18 år på grund af manglende dokumentation for sikkerhed og virkning. Må ikke gives til børn under 5 år.

Ældre

Brugen af Mesalazin Orion til ældre patienter bør ske med forsigtighed og altid begrænses til patienter med normal nyrefunktion.

Hvis du har taget for meget Mesalazin Orion

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere af Mesalazin Orion, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Mesalazin Orion

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Mesalazin Orion

Det er vigtigt at du tager dine Mesalazin Orion tabletter hver dag, selv hvis du ikke har symptomer på colitis ulcerosa. Afslut altid den behandling du har fået udskrevet. Spørg lægen, eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Alle lægemidler kan give allergiske reaktioner, selvom alvorlige allergiske reaktioner er meget sjældne. Hvis du får nogen af følgende symptomer efter brug af dette lægemiddel, skal du stoppe med at tage tabletterne og omgående kontakte din læge:

- allergisk hududslæt
- feber
- vejrtrækningsbesvær.

Hvis du oplever feber eller irritation i halsen eller munden, skal du stoppe med at bruge disse tabletter og omgående kontakte din læge. Disse symptomer kan i meget sjældne tilfælde skyldes et fald i antallet af hvide blodlegemer (en tilstand, der kaldes agranulocytose).

Alvorlige bivirkninger

Stop med at bruge mesalazin og søg lægehjælp med det samme, hvis du oplever et eller flere af følgende symptomer:

- rødlige, ikke-hævede, målskive-lignende eller cirkulære pletter på kroppen, ofte med vabler i midten, hudafskalning, sår i munden, svælget, næsen, kønsorganerne og øjnene, udbredt udslæt, feber og forstørrede lymfeknuder. Forud for disse alvorlige hududslæt kan der forekomme feber og influenzalignende symptomer.
- hvis du oplever kraftig eller tilbagevendende hovedpine, synsforstyrrelser eller ringen eller summen for ørerne, så kan dette være symptomer på øget tryk i kraniet (idiopatisk intrakranielt hypertension).

Følgende bivirkninger er også rapporteret hos patienter, der bruger mesalazin:

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos til 1 ud af 1.000 personer):

- mavesmerter, diarré, luft i maven, kvalme og opkastning
- hovedpine, svimmelhed
- brystmerter, åndenød eller hævede lemmer på grund af en påvirkning af hjertet
- øget hudfølsomhed over for sollys og ultraviolet lys (lysfølsomhed).

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

- problemer med nyrefunktionen, nogle gange med hævede lemmer eller smerter i siden
- kraftige mavesmerter på grund af akut betændelse i bugspytkirtlen
- forværring af symptomer på tyktarmsbetændelse
- feber, ondt i halsen eller kvalme på grund af ændringer i blodtallet
- åndenød, hoste, hvæsende vejrtrækning, skygge på røntgenbillede af lungerne på grund af allergiske tilstande og/eller betændelsestilstande i lungerne
- diarré og kraftige mavesmerter på grund af en allergisk reaktion i tarmen over for medicinen
- hududslæt eller betændelse
- muskel- og ledsmerter
- gulsot eller mavesmerter på grund af lidelse i lever eller galdeblære
- hårtab og udvikling af skaldethed
- erythema multiforme (særligt hududslæt med udbrud af hævede pletter) og hudsygdommen Stevens-Johnsons syndrom
- følelsesløshed og snurren i fingre og tæer (perifer neuropati)
- fald i sædproduktion, som igen bliver normal efter ophør med medicinen

- blodsygdomme.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres fra forhåndenværende data):

- nyresten og dermed forbundne nyresmerter (se også afsnit 2)
- svære kutane bivirkninger: lægemiddelreaktionen eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN).
- øget tryk inde i kraniet (idiopatisk intrakranielt hypertension).

Lysfølsomhed

Mere alvorlige reaktioner er set hos patienter med eksisterende hudsygdomme, så som atopisk dermatitis og atopisk eksem (børneeksem).

Kontakt din læge, hvis symptomerne varer ved eller bliver mere alvorlige.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterpakning efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger**Mesalazin Orion indeholder:**

- Hver enterotablet indeholder 1000 mg mesalazin
- Øvrige indholdsstoffer er vandfri natriumcarbonat, glycin, povidon, mikrokrySTALLINSK cellulose, crocarmellosenatrium, silica, kolloid vandfri, calciumstearat, methacrylsyre–ethylacrylat copolymer (1:1) dispersion 30%, methacrylsyre–methylmethacrylat copolymer (1:1), methacrylsyre–methylmethacrylat copolymer (1:2), sebacat, talcum, titanoxid (E171), macrogol, gul jernoxid (E172), rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Mesalazin Orion markedsføres i PVC/PVDC-Aluminium-blisterpakket i kartoner indeholdende 60 eller 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Enterotabletterne er aflange med et homogent orangefarvet overtræk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Faes Farma S.A.
Autonomia Etorbidea, 10
48940 Leioa (Bizkaia)
Spanien

Fremstiller

Faes Farma, S.A.
Maximo Agirre Kalea, 14
48940 Leioa (Bizkaia)
Spanien

Eller

Faes Farma, S.A.
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia
Ibaizabal Bidea, Edificio 901
48160 Derio (Bizkaia)
Spanien

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant:
Orion Pharma A/S
medinfo@orionpharma.com

Dette lægemiddel er godkendt i medlemslandene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde under følgende navne:

Finland: Mesalazin orion 500 mg enterotablett
Danmark: Mesalazin orion 500 mg enterotablett
Sverige: Mesalazin orion 500 mg enterotablett
Norge: Mesalazin orion 500 mg enterotablett
Malta: Mecolzine 500 mg gastro-resistent tablets
Cypern: Mecolzine 500 mg gastro-resistent tablets
Spanien: Azzavix 500 mg comprimidos gastrorresistentes

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2025