

**Indlægsseddel: Information til brugeren**  
**Sumatriptan 2care4 100 mg filmovertrukne tabletter**  
sumatriptan

04-2026  
P385033-4

**Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.**

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk).

#### **Oversigt over indlægssedlen**

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sumatriptan 2care4
3. Sådan skal du tage Sumatriptan 2care4
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

### **1. Virkning og anvendelse**

- Sumatriptan tilhører en gruppe af lægemidler, som anvendes mod migræne. Det aktive stof i Sumatriptan 2care4 er sumatriptan, en 5-HT<sub>1</sub>-receptoragonist.
- Det menes, at migrænehovedpine skyldes udvidelse af blodkarrene. Sumatriptan sammentrækker blodkarrene og lindrer dermed migrænehovedpinen.
- Sumatriptan bruges til behandling af migræneanfald med eller uden aura (en advarende fornemmelse, som normalt involverer synsforstyrrelser, f.eks. lysglimt, zigzaglinjer, stjerner eller bølger).

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

### **2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sumatriptan 2care4**

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

#### **Tag ikke Sumatriptan 2care4**

- hvis du er **allergisk** over for sumatriptan eller et af de øvrige indholdsstoffer i Sumatriptan 2care4 (angivet i afsnit 6).
- hvis du har haft et **hjertetilfælde**.
- hvis du har en hjertesygdom.
- hvis du har **symptomer, der kunne tyde på en hjertesygdom**, f.eks. midlertidige brystmerter eller en trykkende fornemmelse i brystet.
- hvis du **tidligere har haft et slagtilfælde** eller forbigående iskæmisk anfald (TIA, en lettere form for slagtilfælde, som varer i mindre end 24 timer).
- hvis du har kredsløbsproblemer i benene, som forårsager krampelignende smerter, når du går (kaldes perifer vaskulær sygdom).
- hvis du har markant **højt blodtryk**, eller hvis dit blodtryk er højt på trods af medicinsk behandling.
- hvis du har alvorlige **leverproblemer**.
- hvis du tager eller for nylig har taget lægemidler, der indeholder **ergotamin** eller ergotaminderivater (herunder methysergid) eller nogen som helst triptan/5-hydroxytryptamin<sub>1</sub> (5-HT<sub>1</sub>)-receptoragonister (såsom naratriptan eller zolmitriptan).
- hvis du tager eller for nylig har taget **lægemidler til behandling af depression**, som tilhører gruppen af lægemidler, der kendes under navnet monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere).

Hvis du mener, at du har et af disse problemer, eller hvis du er i tvivl, skal du kontakte lægen, inden du tager Sumatriptan 2care4.

#### **Advarsler og forsigtighedsregler**

Inden du får ordineret Sumatriptan 2care4, vil din læge undersøge, om din hovedpine skyldes migræne eller en anden lidelse.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Sumatriptan 2care4.

- hvis du ved, at du har lever- eller nyreproblemer.
- hvis du har fået diagnosen **epilepsi** eller andre sygdomme, der sænker tærsklen for epileptiske anfald.
- hvis du ved, at du er **allergisk over for antibakterielle lægemidler**, der tilhører gruppen af sulfonamider.
- hvis du har kontrolleret højt blodtryk, da sumatriptan i få tilfælde har vist sig at øge blodtrykket.
- hvis du tager selektive serotoninoptagshæmmere (SSRI'er) eller serotonin/noradrenalin-genoptagshæmmere (SNRI'er). Øgede reflekser og manglende koordination er set ved samtidig brug af selektive serotoninoptagshæmmere og sumatriptan.
- hvis du oplever smerter og/eller sammensnøring i brystet eller halsen. Disse bivirkninger er sædvanligvis kortvarige. Hvis de varer ved, og du er bekymret, eller hvis de bliver alvorlige, skal du straks kontakte din læge.
- hvis du har hovedpine dagligt. Du kan få kronisk hovedpine, hvis du tager Sumatriptan 2care4 for ofte. I sådanne tilfælde bør du kontakte lægen, da du muligvis er nødt til at holde op med at tage Sumatriptan 2care4.
- hvis du er i risikogruppen for at udvikle en hjertesygdom (hvis du f.eks. lider af diabetes, er storryger eller er i gang med nikotinerstatningsterapi), og især hvis du er kvinde i overgangsalderen eller mand over 40 år med disse risikofaktorer, bør din læge undersøge din hjertefunktion, inden du får Sumatriptan 2care4. Der er i meget sjældne tilfælde set alvorlige hjertelidelser efter indtagelse af Sumatriptan 2care4, endda selvom der ikke blev fundet tegn på nogen form for hjertesygdom. Rådfør dig med din læge, hvis du er bekymret.
- hvis du tager naturlægemidler, der indeholder perikon (*hypericum perforatum*) samtidig med sumatriptan, kan bivirkningerne opstå hyppigere.

### Brug af andre lægemidler sammen med Sumatriptan 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.

Visse lægemidler kan påvirke effekten af Sumatriptan 2care4, og Sumatriptan 2clare4 kan påvirke effekten af andre lægemidler. Kontakt din læge, hvis du tager:

- **andre lægemidler mod migræne**, f.eks. ergotamin, ergotaminderivater eller andre lægemidler i samme gruppe som sumatriptan (såsom naratriptan, zolmitriptan, rizatriptan, almotriptan og eletriptan). Hvis du har taget disse lægemidler, skal der gå 24 timer, før du må tage sumatriptan. Omvendt må du ikke tage ergotamin, ergotaminderivater eller lægemidler i samme gruppe som sumatriptan før 6 timer efter indtagelse af sumatriptan.
- **lægemidler til behandling af depression** (MAO-hæmmere, serotoningenoptagshæmmere eller serotonin/noradrenalin-genoptagshæmmere).

### Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

#### Graviditet:

Der findes kun begrænset information om, hvorvidt Sumatriptan 2care4 er sikker at bruge under graviditet. Indtil videre tyder denne information ikke på en øget risiko for fostermisdannelse. Du må kun tage Sumatriptan 2care4 efter lægens anvisning.

#### Amning:

Rådfør dig med din læge eller apotekspersonalet om brugen af dette lægemiddel, mens du ammer. Sumatriptan udskilles i modermælken. Du må ikke amme dit barn i 12 timer efter du har taget sumatriptan. Hvis du udskiller modermælk i løbet af denne tid, skal du kassere mælken og ikke give den til dit barn.

Nogle ammende kvinder rapporterede bryst og/eller brystvortesmerter efter anvendelsen af sumatriptan. Smerten er normalt forbigående og forsvinder mellem 3 til 12 timer.

### Trafik- og arbejdssikkerhed

Selve migrænen eller behandlingen af denne med Sumatriptan 2care4 kan forårsage døsighed. Du må ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis du er påvirket.

### Sumatriptan 2care4 indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

### Sumatriptan 2care4 indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. filmoverttrukket tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.

## 3. Sådan skal du tage Sumatriptan 2care4

---

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Sumatriptan må ikke tages for at forebygge migræneanfald; det skal bruges til at behandle et migræneanfald. Sumatriptan skal tages så hurtigt som muligt efter, at migrænehovedpinen er startet. Det er dog lige så effektivt, hvis du tager det på et senere tidspunkt under anfaldet.

Den sædvanlige dosis til voksne er 50 mg. Nogle patienter kan have behov for 100 mg. Hvis Sumatriptan 2care4 ikke giver øjeblikkelig lindring, hjælper det ikke at tage flere tabletter mod samme anfald. Sumatriptan 2care4 kan anvendes til næste anfald. Hvis migrænen forsvinder efter første dosis, men derefter vender tilbage, kan du tage endnu en tablet, hvis der er gået mindst to timer, siden du tog den første tablet.

Tag ikke mere end 300 mg (**tre 100 mg**-tabletter) i løbet af 24 timer.

Vær opmærksom på, at ikke alle anførte doseringsmuligheder kan følges med dette præparat.

### Brug til børn og unge

Sumatriptan 2care4 bør ikke bruges til børn, unge og til patienter over 65 år.

Hos patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion bør lave doser på 25-50 mg overvejes.

### Indtagelse

Du skal synke tabletten hel med lidt vand.

### Hvis du har taget for meget Sumatriptan 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Sumatriptan 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomerne på overdosering er de samme som anført under afsnit 4 "Bivirkninger".

### Hvis du har glemt at tage Sumatriptan 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

### Hvis du holder op med at tage Sumatriptan 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

## 4. Bivirkninger

---

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nedenstående bivirkninger er mulige med følgende hyppigheder:

**Almindelige** (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

- døsigthed.
- svimmelhed.
- prikkende eller stikkende fornemmelse.
- midlertidig blodtryksstigning (kort tid efter behandling).
- rødmen.
- kvalme eller opkastning.
- spændingsfornemmelse. Denne er generelt forbigående (midlertidig), men kan være stærk og forekomme i hele kroppen, herunder bryst og hals.
- muskelsmerter.
- smerter.
- varme- eller kuldefornemmelse, tryk eller sammensnøring. Disse symptomer kan være stærke og kan forekomme i hele kroppen, herunder bryst og hals.
- en følelse af svaghed.
- træthed.
- vejrtrækningsbesvær.

**Sjældne** (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

- brystmerter

**Meget sjældne** (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter)

- hvis du får taget blodprøver for at kontrollere leverfunktionen, kan Sumatriptan 2care4 påvirke resultaterne.

**Ikke kendt** (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de eksisterende oplysninger):

- allergiske hudreaktioner: hududslæt, f.eks. røde pletter eller nældefeber (blærer på huden).
- anafylaksi (kraftig allergisk reaktion, f.eks. opsvulmede øjenlåg, læber eller opsvulmet ansigt og pludselig hvæsende vejrtrækning, flakkende hjerte eller sammensnøring i brystet). Stop med at tage Sumatriptan 2care4, og kontakt straks din læge, hvis der opstår en kraftig allergisk reaktion.
- nystagmus (ufrivillig fremad- og tilbagegående bevægelse af øjeæblet).
- scotoma (mørke pletter i synsfeltet).
- rysten og dystoni (ufrivillige muskelsammentrækninger).
- krampeanfald - sædvanligvis hos personer, som tidligere har haft epilepsi.
- synsforstyrrelser (flimren, dobbeltsyn, nedsat syn, synstab, herunder permanent defekt), selvom disse kan skyldes selve migræneanfaldet.
- hurtig hjerterytme, langsomt hjerteslag, hjertebanken, uregelmæssigt hjerteslag og alvorlige komplikationer i kranspulsåren, hjertetilfælde og forbigående iskæmiske EKG-forandringer.
- blodtryksfald, som kendetegnes ved bleghed eller et blåt skær over huden og/eller finger-, tå-, øre-, næse- eller kæbesmerter som reaktion på forkølelse eller stress (Raynauds fænomen).
- tarmbetændelse, hvilket kan vise sig som mavepine i nederste venstre del af maven og blodig diarré (iskæmisk colitis).
- diarré.
- ledsmerter.
- en følelse af uro.
- nakkestivhed.
- kraftig svedtendens.
- hvis du for nylig har haft en skade, eller hvis du har betændelse (som gigt eller betændelse i tyktarmen), så kan du opleve smerte eller en forværring af smerten på det sted, du har haft en skade eller har betændelse.
- synkebesvær.
- serotonin syndrom er blevet rapporteret (kendetegnet ved symptomer såsom rastløshed, hallucinationer, koordinationsbesvær, hurtig hjerterytme, hurtige ændringer i blodtryk, øget kropstemperatur, overaktive reflekser, kvalme, opkastning og diarré).
- angst.

### Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

## 5. Opbevaring

---

Opbevar Sumatriptan 2care4 utilgængeligt for børn.

Tag ikke Sumatriptan 2care4 efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

## 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

---

### Sumatriptan 2care4 indeholder:

- Aktivt stof: sumatriptan. 1 filmovertrukken tablet indeholder 100 mg sumatriptan (som succinat).
- Øvrige indholdsstoffer:  
Tabletkerne: lactosemonohydrat, croscarmellose, vandfri kolloid silica, mikrokrySTALLINSK cellulose og magnesiumstearat.  
Tabletovertræk: hypromellose, lactosemonohydrat, titandioxid (E171), macrogol 3000 og glyceroltriacetat.

### Udseende og pakningsstørrelser

Sumatriptan 2care4 100 mg filmovertrukne tabletter er hvide til grålighvide, aflange filmovertrukne tabletter, mærket med "100" på den ene side og glatte på den anden side.

Lægemidlet kan fås i pakningsstørrelser med 6, 12 og 18 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

### Indehaver af markedsfø- ringstilladelsen:

2care4  
Stenhuggervej 12  
6710 Esbjerg V

### Fremstiller:

2care4  
Stenhuggervej 12-14  
6710 Esbjerg V

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2026.