

Indlægsseddel: Information til brugeren

Atrovent 20 mikrogram/dosis inhalationsspray, opløsning

ipratropiumbromid

02-2026
P519423-1

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på
www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Atrovent
3. Sådan skal du bruge Atrovent
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Atrovent er et luftvejsudvidende lægemiddel, der gør det lettere at trække vejret. Du kan bruge Atrovent ved kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL eller rygerlunger) og til astmaanfald.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Atrovent

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Atrovent

- hvis du er allergisk over for ipratropiumbromid, atropin, samt andre atropinlignende stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Atrovent (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Atrovent hvis du får, har eller har haft nogen af nedenstående sygdomme eller tilstande:

- Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme i sjældne tilfælde lige efter brug af Atrovent. Symptomer på dette er nældefeber, hævelse i mund og i svælget, hududslæt og åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Paradoks bronkospasme kan forekomme ved brug af inhalationslægemidler. Symptomer på dette er kortåndethed, vejrtrækningsbesvær, astmalignende anfald og åndenød. Det kan være livstruende, stop derfor med at tage lægemidlet og kontakt straks læge eller skadestue.
- Akut grøn stær (snærvinklet glaukom) eller grøn stær i familien.
- Øjensmerter, øjenubehag, sløret syn eller synsforstyrrelser, som ringe eller pletter samtidig med røde øjne. Søg omgående læge, da disse symptomer kræver specialbehandling.
- Forstørret blærehalskirtel (prostata).
- Besvær med at lade vandet, evt. vandladningsstop.
- Cystisk fibrose, da Atrovent kan give fordøjelsesbesvær.

Du må ikke, uden at have talt med lægen, øge dosis. Behov for mere lægemiddel kan være tegn på, at din sygdom er forværret.

Lægemidlet må ikke komme i øjnene. Skulle det alligevel ske, skyl da straks øjnene med koldt vand fra vandhanen.

Brug af andre lægemidler sammen med Atrovent

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.

Du kan bruge Atrovent sammen med andre lægemidler, der udvider bronkierne for at opnå en bedre virkning. Du bør dog ikke bruge Spiriva sammen med Atrovent, da virkningen af samtidig brug ikke er undersøgt.

Hvis du sammen med Atrovent bruger visse andre typer lægemidler, kan det være nødvendigt at ændre dosis. Tal med din læge, hvis det drejer sig om følgende:

- Lægemidler med såkaldt antikolinerg virkning (f.eks. Spiriva eller Spiolto), da virkningen ved samtidig længerevarende brug ikke er undersøgt. Risikoen for bivirkninger kan øges, hvis der bruges andre lægemidler, der har en såkaldt antikolinerg virkning. Tal med lægen eller apoteket, hvis du ønsker yderligere information.
- Lægemidler, der tilhører grupperne af beta-adrenerge stoffer (f.eks. Ventoline og Bricanyl) og xantin-derivater (f.eks. theophyllin), da de kan forstærke den luftvejsudvidende virkning.
- Visse andre typer lægemidler til inhalation (såkaldte beta-agonister), da risikoen for akut grøn stær kan øges.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdsikkerhed

Atrovent påvirker normalt ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdsikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken; men oplever man problemer med øjnene, f.eks. synsforstyrrelser, eller svimmelhed, bør man være særlig opmærksom.

Atrovent indeholder ethanol (alkohol)

Dette lægemiddel indeholder ca. 8 mg alkohol (ethanol) pr. inhalation. Mængden pr. inhalation af dette lægemiddel svarer til mindre end 1 ml øl eller 1 ml vin.

Den mindre mængde alkohol i dette lægemiddel vil ikke have nogen nævneværdig effekt.

3. Sådan skal du bruge Atrovent

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis for voksne og børn over 7 år er

2 pust 4 gange daglig.
Den daglige dosering bør normalt ikke overstige 12 pust.

Atrovent inhalationsspray må kun anvendes til oral inhalation.

Børn bør kun bruge Atrovent under opsyn af en voksen.

Bugsvejledning – se sidst i indlægssedlen.

Hvis du har brugt for meget Atrovent

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Atrovent, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

For meget lægemiddel kan give mundtørhed, synsforstyrrelser (problemer med at se skarpt) og hurtig puls.

Hvis du har glemt at bruge Atrovent

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Atrovent

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger, som du eller dine pårørende øjeblikkeligt skal reagere på, er anført med •

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 patienter ud af 100):

Hovedpine, svimmelhed, irritation i svælget, hoste, mundtørhed, kvalme og maveproblemer med diarré eller forstoppelse.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 patienter ud af 1000):

- Alvorlige overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner). Det viser sig ved pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter eller timer) eller hævelse af hals, tunge, mund, læber og ansigt. Kan være livsfarligt. **Ring evt. 112.**

- Akut grøn stær (snærvinklet glaukom). Det viser sig ved hovedpine, kvalme, synsnedvættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. **Ring evt. 112.**
- Astmaligende anfald og åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. **Ring evt. 112.**
- Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Øjensmerter, øjenubehag, hævelse af hornhinden, sløret syn eller synsforstyrrelser, som ringe eller pletter eller røde øjne. Søg omgående læge, da disse symptomer kræver specialbehandling. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Pludselig krampe i struben med åndenød og følelse af, at luftvejene lukker vejtrækningsproblemer og/eller manglende (laryngospasme)

Desuden: Overfølsomhed, store pupiller, tør hals, opkastning, mundbetændelse, hjertebanken, hududslæt eller hudkløe.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 patienter ud af 10.000):
Nedsat evne til at se skarpt eller nældefeber.

Indberetning af bivirkninger
Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Atrovent utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Må ikke nedfryses og skal beskyttes mod direkte sollys. Spraybeholderen indeholder sprayvæske under tryk. Må ikke udsættes for temperaturer højere end 50 °C. Beholderen må ikke punkteres eller brændes.

Brug ikke Atrovent efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Atrovent indeholder:
– Aktivt stof: ipratropiumbromid. 1 pust indeholder 20 mikrogram ipratropiumbromid.
– Øvrige indholdsstoffer: vandfri citronsyre, rensat vand, vandfri ethanol, nitrogen (inaktiv gas) og HFA 134a. Indeholder flourholdige drivhusgasser. Hver inhalator indeholder 12,3 g HFA-134a (norfluran), svarende til 0,018 ton CO₂-ækvivalent (globalt opvarmningspotentiale, GWP = 1430).

Udseende og pakningsstørrelser
Atrovent inhalationsspray er en opløsning, hvor det aktive stof er opløst i den flydende drivgas. Opløsningen er i en metalbeholder.

Atrovent inhalationsspray 20 mikrogram/dosis findes i én pakningsstørrelse med 200 doser.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:
2care4 ApS
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V


Fremstiller:
2care4 ApS
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V



Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2026.

Brugsvejledning for Atrovent inhalationsspray

Du vil kun opnå den bedste virkning, når du bruger sprayen på den rigtige måde. Læs her hvordan:

Inden sprayen bruges første gang skal metalbeholderen trykkes ned 2 gange.

1. Tag beskyttelseshætten af mundstykket.	
2. Pust helt ud.	
3. Hold sprayen som vist på figur 1 (med metalbeholderens bund opad). Placer derefter sprayens mundstykke i munden og luk læberne tæt om det.	
4. Tag så en rolig og dyb indånding gennem munden og tryk samtidig på metalbeholderens bund (som vender opad!). Det er meget vigtig at starte indåndingen, lige inden du udløser et pust. Hold vejret i et par sekunder, fjern sprayen fra munden og ånd ud igen.	(figur 1)
Proceduren gentages før næste inhalation.	

5. Sæt beskyttelseshætten på mundstykket igen efter brug.	
Hvis sprayen ikke har været brugt i 3 dage, skal du trykke metalbeholderen ned én gang før brug.	
Beholderen er ikke gennemsigtig og derfor kan man ikke se, når den er tom. Sprayen indeholder 200 pust. Når antallet af pust er brugt (normalt efter 3 ugers brug), vil der stadig være lidt væske i beholderen. Inhalatoren skal alligevel erstattes af en ny for at være sikker på at få den korrekte dosis ved hver inhalation.	
Rengør mundstykket mindst én gang ugentlig ved at rense med varmt vand (se figur 2). Skyl eventuelle sæberester væk inden tørring.	
Mundstykket må ikke komme i opvaskemaskinen.	(figur 2)
Efter rengøringen bør mundstykket tørre uden brug af varme (se figur 3).	
Når mundstykket er tørt, kan sprayen og beskyttelseshætten sættes på igen.	(figur 3)