

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zolmitriptan 2care4 2,5 mg tabletter

zolmitriptan

05-2022
P160045-1

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på
www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zolmitriptan 2care4
3. Sådan skal du tage Zolmitriptan 2care4
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zolmitriptan 2care4 indeholder zolmitriptan og tilhører gruppen af lægemidler der hedder triptaner.

Zolmitriptan 2care4 bruges til at behandle migræne-hovedpine.

- Migrænesymptomer kan skyldes udvidelse af blodkar i hjernen. Zolmitriptan 2care4 reducerer udvidelsen af disse blodkar, hvilket hjælper til at fjerne hovedpinen og andre symptomer på migræneanfald forbindelse, såsom kvalme eller opkast og være meget lys- og lydfølsom.

Zolmitriptan 2care4 virker kun når migræneanfaldet er startet, det vil ikke virke forebyggende.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zolmitriptan 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Zolmitriptan 2care4

- hvis du er allergisk over for zolmitriptan, menthol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zolmitriptan 2care4 (angivet i afsnit 6).
- hvis du har forhøjet blodtryk.
- hvis du har haft hjerteproblemer, inklusive et hjerteanfald, angina pectoris (brystsmerter ved motion eller anstrengelse), Prinzmetal's angina (brystsmerter ved hvile) eller har haft hjertelaterede symptomer som f.eks. kortåndethed eller trykken for brystet.
- hvis du har haft en hjerneblødning eller kortvarige symptomer på hjerneblødning (forbigående iskæmisk anfald eller TIA).
- hvis du har alvorlige nyreproblemer.
- hvis du samtidig tager følgende lægemidler for migræne:
 - o ergotamin
 - o lægemidler af ergot-typen (såsom dihydroergotamin og methysergid)

- o eller andre triptan lægemidler mod migræne (se afsnittet nedenfor "Brug af anden medicin sammen med Zolmitriptan 2care4" for yderligere information).

Hvis du er i tvivl om ovenstående gælder for dig, så kontakt din læge eller apoteket.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Zolmitriptan 2care4.

Før du tager Zolmitriptan 2care4, skal du fortælle lægen hvis:

- Du har øget risiko for iskæmisk hjertesygdom (svigtende blodtilførsel til hjertets pulsårer). Risikoen er større, hvis du ryger, har højt blodtryk, forhøjet kolesterol i blodet, sukkersyge eller har iskæmisk hjertesygdom i familien.
- Du har fået at vide, at du har Wolff-Parkinson-White syndrom (uregelmæssig hjerterytme).
- Du har haft leverproblemer.
- Din hovedpine er anderledes end din normale migræne-hovedpine.
- Du tager lægemidler til behandling af depression (se "Brug af anden medicin sammen med Zolmitriptan 2care4" senere i dette afsnit).

Hvis du tager på hospitalet, bør du fortælle, at du tager Zolmitriptan 2care4.

Zolmitriptan 2care4 anbefales ikke til personer under 17 år eller over 65 år.

Som for andre migrænebehandlinger kan overforbrug af Zolmitriptan 2care4 føre til daglige hovedpiner eller medføre, at din migrænehovedpine forværres. Kontakt din læge, hvis du mener, at det er tilfældet for dig. Det er måske nødvendigt at afslutte behandlingen med Zolmitriptan 2care4 for at forbedre dette.

Brug af anden medicin sammen med Zolmitriptan 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.

Du bør specielt kontakte lægen, hvis du tager nogle af følgende lægemidler:

Lægemidler til migræne

- hvis du tager andre triptaner end Zolmitriptan 2care4, skal du vente 24 timer, inden du tager Zolmitriptan 2care4.
- hvis du tager Zolmitriptan 2care4 skal der gå 24 timer, inden du tager andre triptaner end Zolmitriptan 2care4.
- hvis du tager medicin, som indeholder ergotamin eller medicin af ergot-typen (såsom dihydroergotamin og methysergid), bør du

vente 24 timer med at tage Zolmitriptan 2care4.

- har du taget Zolmitriptan 2care4, bør der gå 6 timer, før du tager ergotamin eller medicin af ergot-typen.

Lægemidler til depression

- moclobemid eller fluvoxamine.
- lægemidler som kaldes SSRI'er (serotonin-genoptags-hæmmere).
- lægemidler som kaldes SNRI'er (serotonin-noradrenalin-genoptags-hæmmere) f.eks. venlafaxin, duloxetin.

Andre lægemidler:

- cimetidin (til behandling af sure opstød og mavesår).
- quinolon antibiotika (f.eks. ciprofloxacin).

Bivirkninger kan optræde hyppigere, hvis du sammen med Zolmitriptan 2care4 tager naturlægemidlet Johannesurt (Hypericum perforatum).

Brug af Zolmitriptan 2care4 sammen med mad og drikke

Du kan tage Zolmitriptan 2care4 med eller uden mad og drikke. Det påvirker ikke virkningen af Zolmitriptan 2care4.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

- Det er ikke klarlagt, hvorvidt Zolmitriptan 2care4 er skadeligt under graviditet. Du skal fortælle det til din læge, hvis du er gravid eller prøver at blive gravid.
- Du må ikke amme i 24 timer efter du har taget Zolmitriptan 2care4.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ved et migræneanfald kan reaktionsevnen være nedsat midlertidigt. Dette bør du tænke på ved bilkørsel og maskinbetjening.

Det er usandsynligt, at Zolmitriptan 2care4 påvirker evnen til at køre eller betjene maskiner. Du bør dog vente og se, hvordan Zolmitriptan 2care4 påvirker dig, før du udfører ovenstående.

Zolmitriptan indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.

3. Sådan skal du tage Zolmitriptan 2care4

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Du kan tage Zolmitriptan 2care4 så snart migræne-hovedpinen starter. Du kan også tage det når et anfald er undervejs.

- Den almindelige dosis er enten 2,5 mg eller 5 mg.
- Synk tabletten hel med et glas vand.
- Du kan tage endnu en dosis, hvis migrænen stadig er til stede efter to timer, eller hvis den vender tilbage indenfor 24 timer.

Hvis disse tabletter ikke giver tilfredsstillende hjælp med din migræne, skal du fortælle det til din læge. Din læge kan øge dosis til 5 mg eller ændre din behandling.

Du må ikke tage mere end den dosis der er anvist til dig.

- Du må ikke tage mere end to doser på en dag. Den maksimale døgndosis er 10 mg.

Hvis du har taget for meget Zolmitriptan 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Zolmitriptan 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig tilpas).

Hvis du har glemt at tage Zolmitriptan 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage

Zolmitriptan 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle af nedenstående symptomer kan være en del af selve migræneanfaldet.

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

- Unormal følelse som prikken eller stikken i dine fingre, tæer eller hud, eller hud, som er følsom overfor berøring.
- Søvnighed, svimmelhed eller varmefølelse.
- Hovedpine.
- Uregelmæssig hjerterytme.
- Kvalme, opkastning.
- Mavesmerter.
- Mundtørhed.
- Muskelsvaghed eller muskelsmerter.
- Følelse af svaghed.
- Tyngdefornemmelse eller følelse af tæthed, smerter eller tryk på svælg, hals, nakke, arme, ben eller bryst.
- Synkebesvær.

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

- Meget hurtig hjerterytme.
- Lettere forhøjet blodtryk.
- Øget urinmængde eller hyppigere vandladning.

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

- Allergiske reaktioner inklusive kløende udsæt (nældefeber) og hævelse af ansigt, læber, mund, tunge og svælg. Hvis du tror, at Zolmitriptan 2care4 giver dig en allergisk reaktion, skal du stoppe med at tage det og kontakte din læge øjeblikkeligt.

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter)

- Angina (smerter i brystet, ofte udløst af bevægelse), hjerteanfald eller kramper i hjertets blodårer. Hvis du bemærker brystmerter eller kortåndethed efter du har taget Zolmitriptan 2care4, skal du **kontakte din læge og stoppe med at tage Zolmitriptan 2care4**.
- Kramper i blodårerne i maven, som kan forårsage skader i maven. Du kan få mavesmerter eller blodig diarré. Hvis dette sker, skal du **kontakte din læge og stoppe med at tage Zolmitriptan 2care4**.
- Pludselig vandladningstrang.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.

Tag ikke Zolmitriptan 2care4 efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zolmitriptan 2care4 indeholder:

- Aktivt stof: zolmitriptan. 1 tablet indeholder 2,5 mg zolmitriptan.
- Øvrige indholdsstoffer:
 - Mannitol (Ph.Eur.)
 - Maltodextrin
 - Mikrokrystallinsk cellulose
 - Crospovidon type A
 - Natriumhydrogenkarbonat
 - Citronsyre
 - Kolloid silica, vandfri
 - Saccharinnatrium
 - Magnesiumstearat
 - Mentholsmag (maltodextrin, naturlig menthol, modificeret majsstivelse)

Udseende og pakningsstørrelser

Zolmitriptan 2care4 tabletter er hvide, runde og flade tabletter med skårne kanter.

Zolmitriptan 2care4 2,5 mg tabletter er pakket i aluminium/aluminium blister indeholdende 6 eller 18 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

Zolmitriptan 2care4 svarer til Zolmitriptan STADA.

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2022.