

Indlægsseddel: Information til brugeren

Esomeprazol 2care4 40 mg hårde enterokapsler

esomeprazol

09-2025
P562344-1

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Esomeprazol 2care4
3. Sådan skal du tage Esomeprazol 2care4
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Esomeprazol 2care4 indeholder et lægemiddel, der kaldes esomeprazol. Det tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes ”syrepumpe-hæmmere”. De virker ved at nedsætte den syremængde, der produceres i maven.

Esomeprazol 2care4 anvendes til:

- Voksne
- Gastroesofageal refluks sygdom (GERD). Det er, når mavesyre fra maven går op i spiserøret og medfører smerte, betændelse og halsbrand. Dette lægemiddel gives for:
 - heling af spiserøret, hvis det er skadet eller betændt
 - at forhindre at disse tilstande vender tilbage
 - at lindre de ubehagelige symptomer, som ofte ledsager disse tilstande
 - Sår i mavesækken eller den øvre del af tarmen (tolvfingertarmen), der er inficeret med en bakterie, som kaldes ”*Helicobacter pylori*”. Hvis du har denne tilstand, kan din læge også ordinere dette lægemiddel sammen med visse antibiotika for:
 - at hele sår i den øvre del af tarmen i forbindelse med bakterien *Helicobacter pylori*
 - at forebygge tilbagefald af sår, der er forbundet med denne bakterie
 - Mavesår, der skyldes lægemidler, der kaldes NSAID’ere (ikke-steroid betændelseshæmmende lægemidler). Dette lægemiddel gives for:
 - at hele mavesår, der skyldes NSAID’ere
 - at forhindre, at der opstår mavesår og sår i den øverste del af tarmen, hvis du tager NSAID’ere.
 - Opfølgende behandling efter forebyggende behandling med esomeprazol givet i en blodåre mod gentagne blødninger af sår.
 - For meget mavesyre, der skyldes en svulst i bugspytkirtlen (Zollinger-Ellisons syndrom).

- Unge på 12 år og derover
- Når syre fra maven stiger op i spiserøret og giver halsbrand, inflammation (betændelselignende tilstand) og smerter, også kaldet gastroesofageal refluks sygdom (GERD).
 - Til behandling af mavesår, inficeret med bakterien *Helicobacter pylori*. Hvis du fejler dette, kan din læge også ordinere antibiotika for at behandle infektionen og tillade såret at hele.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Esomeprazol 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Esomeprazol 2care4

- hvis du er allergisk over for esomeprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Esomeprazol 2care4 (angivet i afsnit 6).
- hvis du er allergisk over for andre syrepumpe-hæmmende lægemidler (f.eks. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, omeprazol).
- hvis du tager lægemidler, som indeholder nelfinavir (lægemidler, der anvendes til behandling af hiv-infektion).
- hvis du nogensinde har fået et alvorligt hududslæt eller hudafskalning, blæredannelse og/eller mundsår efter at have taget Esomeprazol 2care4 eller andre relaterede lægemidler.

Tag ikke Esomeprazol 2care4, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Hvis du ikke er sikker, skal du tale med lægen eller apotekspersonalet inden du tager Esomeprazol 2care4.

Advarsler og forsigtighedsregler

- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Esomeprazol 2care4 hvis
- du har alvorlige leverproblemer.
 - du har alvorlige nyreproblemer.
 - du har mangel på B₁₂-vitamin.
 - du nogensinde har fået hudreaktioner efter at have taget et lægemiddel af samme slags som Esomeprazol 2care4, der nedsætter syreindholdet i maven.
 - du skal have taget en særlig blodprøve (chromogranin A).

Udslæt og hudsymptomer

Hvis du får udslæt, især på de dele af huden, der er udsat for sol, skal du snarest muligt sige det til lægen, da du kan være nødt til at holde op med at tage Esomeprazol 2care4. Husk også at nævne andre negative virkninger såsom ledsmerter.

Alvorlige hudreaktioner, herunder Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), har været rapporteret i forbindelse med behandling med Esomeprazol 2care4. Stop med at bruge Esomeprazol 2care4, og søg straks lægehjælp, hvis du bemærker nogen af de symptomer, der er forbundet med disse alvorlige hudreaktioner, som er beskrevet i afsnit 4.

- Esomeprazol 2care4 kan skjule symptomerne på andre sygdomme. **Derfor skal du straks tale med lægen, hvis du, inden du begynder at tage, eller mens du tager Esomeprazol 2care4, oplever noget af følgende:**
- Du har et stort vægttab uden grund og har problemer med at synke.
 - Du får mavesmerter eller fordøjelsesbesvær.
 - Du begynder at kaste mad eller blod op.
 - Du har sort afføring (blodig afføring).

Hvis du har fået ordineret Esomeprazol 2care4 ”efter behov” skal du kontakte lægen, hvis symptomerne fortsætter eller skifter karakter.

Når du tager protonpumpehæmmere som Esomeprazol 2care4, kan din risiko for brud på hofte, håndled og ryg være øget en smule, især i en periode over et år. Fortæl det til din læge hvis du har osteoporose eller hvis du tager kortikosteroider (hvilket kan øge risikoen for osteoporose).

Børn under 12 år
Esomeprazol 2care4 anbefales ikke til børn under 12 år.

Brug af andre lægemidler sammen med Esomeprazol 2care4
Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.

Tag ikke Esomeprazol 2care4, hvis du tager følgende lægemiddel:

- Nelfinavir (til behandling af hiv-infektion).

Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du tager nogle af følgende lægemidler:

- Atazanavir (til behandling af hiv-infektion).
- Ketoconazol, itraconazol eller voriconazol (til behandling af svampeinfektioner).
- Digoxin (til behandling af hjerteproblemer).
- Erlotinib (anvendes til behandling af cancer).
- Citalopram, imipramin eller clomipramin (til behandling af depression).
- Diazepam (til behandling af angst, som muskelafslappende middel eller mod epilepsi).
- Phenytoin (mod epilepsi). Hvis du tager phenytoin, vil din læge kontrollere dig, når du begynder eller stopper behandling med Esomeprazol 2care4.
- Lægemidler, der fortynder dit blod, f.eks. warfarin. Din læge kan have behov for at kontrollere dig, når du begynder eller stopper med at tage Esomeprazol 2care4.
- Cilostazol (bruges til behandling af claudicatio intermittens – en smerte i dine ben når du går, der er forårsaget af en utilstrækkelig blodforsyning).
- Cisaprid (mod fordøjelsesbesvær og halsbrand).
- Methotrexat (lægemiddel der anvendes i høje doser til behandling af cancer) – hvis du tager høje doser methotrexat kan din læge midlertidigt stoppe din behandling med Esomeprazol 2care4.
- Clopidogrel (anvendes til behandling af blodpropper (tromber)).
- Tacrolimus (organtransplantation).
- Rifampicin (bruges til behandling af tuberkulose).

- Perikum (*Hypericum perforatum*) (anvendes til behandling af depression).

Hvis din læge har ordineret antibiotikabehandling med amoxicillin og clarithromycin så vel som Esomeprazol 2care4 til behandling af sår, der skyldes infektion med *Helicobacter pylori*, er det meget vigtigt at du fortæller om alle andre lægemidler, du tager.

Brug af Esomeprazol 2care4 sammen med mad og drikke
Du kan tage kapslerne sammen med mad eller på tom mave.

Graviditet og amning
Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Din læge vil afgøre om du må tage Esomeprazol 2care4 i denne periode.

Det vides ikke om Esomeprazol 2care4 udskilles i modermælk. Du skal derfor ikke tage Esomeprazol 2care4, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed
Esomeprazol 2care4 påvirker sandsynligvis ikke evnen til at føre motorkøretøjer eller betjene maskiner. Bivirkninger såsom svimmelhed og synsforstyrrelser kan forekomme, men er ikke almindelige bivirkninger (se afsnit 4). Hvis du er påvirket af dette, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Esomeprazol 2care4 indeholder saccharose og natrium
Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. kapsel, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.

3. Sådan skal du tage Esomeprazol 2care4

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

- Hvis du tager dette lægemiddel i lang tid, vil din læge kontrollere dig (især hvis du tager det i mere end et år).
- Hvis din læge har sagt at du skal tage dette lægemiddel efter behov, skal du fortælle det til lægen, hvis dine symptomer ændrer sig.

Hvor meget skal du tage

- Din læge vil fortælle dig, hvor mange kapsler du skal tage, og i hvor lang tid du skal have dem. Dette afhænger af din tilstand, hvor gammel du er, og hvordan din lever arbejder.
- Den sædvanlige dosis er angivet nedenfor.

Vær opmærksom på, at ikke alle anførte doseringsmuligheder kan følges med dette præparat.

Den sædvanlige dosis er

Voksne i alderen 18 år og derover

Til behandling af halsbrand, som skyldes gastroesofageal refluks sygdom (GERD):

- Hvis din læge har påvist, at dit spiserør er let beskadiget, er den sædvanlige dosis én enterokapsel Esomeprazol 2care4 med 40 mg én gang dagligt i 4 uger. Hvis spiserøret ikke er helet op, kan lægen ordinere samme dosis i yderligere 4 uger.
- Når spiserøret er helet op, er den sædvanlige dosis én enterokapsel esomeprazol 20 mg én gang dagligt.
- Hvis dit spiserør ikke har været beskadiget, er den sædvanlige dosis én enterokapsel esomeprazol 20 mg dagligt. Når sygdommen er under kontrol, kan lægen bede dig om at tage lægemidlet efter behov, op til en maksimal dosis på én enterokapsel esomeprazol 20 mg dagligt.
- Hvis du har alvorlige leverproblemer, kan lægen give dig en mindre dosis.

Til behandling og forebyggelse af sår, som skyldes infektion med *Helicobacter pylori*:

- Den sædvanlige dosis er én enterokapsel esomeprazol 20 mg to gange dagligt i en uge.
- Din læge vil også ordinere antibiotika, som f.eks. amoxicillin og clarithromycin.

Til behandling af mavesår, hvis du tager NSAID´ere (ikke-steroide betændelseshæmmende lægemidler):

- Den sædvanlige dosis er én enterokapsel esomeprazol 20 mg én gang dagligt i 4-8 uger.

Til forebyggelse af mavesår, hvis du tager NSAID´ere (ikke-steroide betændelseshæmmende lægemidler):

- Den sædvanlige dosis er én enterokapsel esomeprazol 20 mg én gang dagligt.

Til opfølgende behandling efter forebyggende behandling med esomeprazol givet i en blodåre mod gentagne blødninger af sår:

- Den sædvanlige dosis er én enterokapsel Esomeprazol 2care4 med 40 mg én gang dagligt i 4 uger.

Til behandling af for meget mavesyre, der skyldes en svulst i bugspytkirtlen (Zollinger-Ellisons syndrom):

- Den sædvanlige dosis er én enterokapsel Esomeprazol 2care4 med 40 mg to gange dagligt.
- Din læge vil tilpasse dosis efter dine behov og vil også afgøre, hvor længe du har behov for at tage lægemidlet. Den maksimale dosis er 80 mg to gange dagligt.

Brug til unge (12 år eller derover)

Behandling af halsbrand, inflammation (betændelseslignende tilstand) og smerter (gastroesofageal refluxsygdom (GERD)):

- Hvis din læge har fundet, at dit spiserør(svælg) er svagt beskadiget, er den sædvanlige dosis én enterokapsel Esomeprazol 2care4 med 40 mg én gang dagligt i 4 uger. Din læge kan vælge at give dig Esomeprazol 2care4 i yderligere 4 uger, hvis dit spiserør ikke er helet
- Den sædvanlige dosis, når spiserøret er helet, er én enterokapsel esomeprazol 20 mg én gang dagligt
- Hvis dit spiserør ikke er beskadiget, er den sædvanlige dosis én enterokapsel esomeprazol 20 mg én gang dagligt.
- Hvis du har alvorlige leverproblemer, kan din læge ordinere en lavere dosis.

Behandling af mavesår, forårsaget af infektion med *Helicobacter pylori*, og forebyggelse af tilbagevendende mavesår:

- Den sædvanlige dosis er én enterokapsel esomeprazol 20 mg to gange dagligt i en uge.
- Din læge vil kombinere behandlingen med for eksempel amoxicillin og clarithromycin (antibiotika).

Hvordan skal du tage kapslerne

- Du kan tage kapslerne når som helst i løbet af dagen
- Du kan tage kapslerne sammen med mad eller på tom mave
- Kapslerne skal synkes hele sammen med vand. Kapslerne må ikke tygges eller knuses. Dette skyldes, at kapslerne indeholder overtrukne pellets, der sørger for, at lægemidlet ikke nedbrydes af mavesyre. Det er vigtigt ikke at ødelægge disse pellets.

Hvad skal du gøre, hvis du har problemer med at synke kapslerne

- Hvis du har problemer med at synke kapslerne:
 - Åben kapslen og tøm pellets ud i et halvt glas vand (uden brus). Anvend ikke andre former for væske
 - Drik væsken straks eller indenfor 30 minutter. Omrør altid, før du drikker væsken
 - For at sikre, at du har indtaget al lægemidlet, skal glasset skylles grundigt med et halvt glas vand, og dette skal drikkes. De små hårde korn indeholder lægemidlet - tyg eller knus dem ikke
- Hvis du slet ikke kan synke, kan kapslen opløses i lidt vand og puttes i en sprøjte. Lægemidlet kan derefter gives til dig gennem en slange direkte ned i din mave ("sonde")

Børn under 12 år
Esomeprazol 2care4 anbefales ikke til børn under 12 år.

Ældre
Der er ikke behov for dosisjustering hos ældre.

Hvis du har taget for meget Esomeprazol 2care4
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Esomeprazol 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Esomeprazol 2care4
Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Esomeprazol 2care4
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du bemærker nogle af følgende alvorlige bivirkninger skal du stoppe med at tage Esomeprazol 2care4 og straks kontakte en læge:

- Gullig hud, mørk urin og træthed, hvilket kan være symptomer på leverproblemer. Disse bivirkninger er sjældne, og forekommer hos op til 1 ud af 1.000 behandlede.

- Pludselig hvæsende vejrtrækning, hævelse af læber, tunge og svælg eller krop, udslæt, besvimelse eller synkebesvær (alvorlig allergisk reaktion). Disse bivirkninger er sjældne, og forekommer hos op til 1 ud af 1.000 behandlede.
- Pludseligt opstået alvorligt udslæt eller rødmen af huden med blæredannelse eller afskalning kan ske selv efter flere ugers behandling. Der kan også være alvorlig blæredannelse og blødning fra læber, øjne, mund, næse og kønsorganer. Hududslættene kan udvikle sig til alvorlige udbredte skader på huden (afskalning af overhuden og de overfladiske slimhinder) med livstruende konsekvenser. Det kan være ´erythema multiforme´, ´Stevens-Johnsons syndrom´, ´toksisk epidermal nekrolyse´. Disse bivirkninger er meget sjældne, og forekommer hos op til 1 ud af 10.000 behandlede.
- Udbredt udslæt, høj kropstemperatur og forstørrede lymfekirtler (DRESS-syndrom eller lægemiddeloverfølsomhedssyndrom). Disse bivirkninger er meget sjældne og kan påvirke op til 1 ud af 10.000 behandlede.

Andre bivirkninger omfatter:

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede)

- Hovedpine.
- Påvirkning af mave eller tarm: diarré, mavesmerter, forstoppelse, luft i maven (flatulens).
- Utilpashed (kvalme) eller opkastning.
- Godartede polypper i mavesækken.

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede)

- Hævede fødder og ankler.
- Søvnforstyrrelser (søvnbesvær).
- Svimmelhed, snurrende følelser som prikken og stikken, føle sig søvngig.
- Følelse af ubalance (svimmelhed udløst fra øret).
- Mundtørhed.
- Forandring i blodprøver, som fortæller hvordan leveren arbejder.
- Hududslæt, ujævnt udslæt (nældefeber), og hudkløe.
- Brud på hofte, håndled eller ryg (hvis Esomeprazol 2care4 bruges i høje doser og over lang tid).

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 behandlede)

- Blodproblemer, f.eks. nedsat antal hvide blodlegemer (leukopeni) eller blodplader (trombocytopeni). Dette kan medføre svaghed, blå mærker eller tilbøjelighed til at få infektioner.
- Lave værdier af natrium i blodet. Dette kan medføre svaghed, opkastning og kramper.
- Følelse af uro, forvirring eller depression.
- Smagsændringer.
- Synsforstyrrelser, f.eks. sløret syn.
- Pludselig hvæsende vejrtrækning eller åndenød (krampe i bronkierne).
- Betændelse i mundhulen.
- Infektion som kaldes ´trøske´, som kan påvirke tarmen, og som skyldes en svamp.
- Leverproblemer, herunder gulsot, som kan medføre gul hud, mørk urin og træthed.
- Hårtab (alopeci).
- Hududslæt, hvis huden udsættes for solskin.
- Ledsmerter (artralgi) eller muskelsmerter (myalgi).
- Følelse af almen utilpashed.
- Øget svedtendens.

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede)

- Ændringer i blodbilledet, herunder mangel på hvide blodlegemer (agranulocytose)
- Aggressivitet.
- Se, føle eller høre ting, der ikke er der (hallucinationer).
- Alvorlige leverproblemer der kan føre til leversvigt og betændelse i hjernen.
- Pludselig alvorligt hududslæt eller blæredannelse eller afskalning. Dette kan være ledsaget af høj feber og ledsmerter (erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer).
- Muskelsvaghed.
- Alvorlige nyreproblemer.
- Udvikling af bryster hos mænd.

Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

- Hvis du tager Esomeprazol 2care4 i mere end tre måneder kan koncentrationen af magnesium i dit blod falde. Lav magnesiumkoncentration kan ses som træthed, ufrivillige muskelsammentrækninger, desorientering, kramper, svimmelhed og øget puls. Hvis du får nogen af disse symptomer skal du omgående kontakte din læge. Lav magnesiumkoncentration kan også føre til en reduktion i kalium- eller calcium koncentrationen i blodet. Det kan være, at din læge vil tage regelmæssige blodprøver på dig for at holde øje med magnesiumkoncentrationen.
- Betændelse i tarmen, der kan medføre diarré.
- Udslæt, eventuelt med ledsmerter.

Esomeprazol 2care4 kan i meget sjældne tilfælde påvirke de hvide blodlegemer og medføre en immundefekt. Hvis du får en infektion med symptomer som feber med en alvorligt påvirket almentilstand eller feber med symptomer på en lokal infektion som ondt i halsen, svælget eller munden eller vandladningsbesvær, skal

du så hurtigt som muligt kontakte lægen for at få taget en blodprøve for at undersøge for mangel på hvide blodlegemer (agranulocytose). Det er vigtigt, at du oplyser om dit lægemiddel på det tidspunkt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Blisterpakning bestående af OPA/Alu/PE + DES-film/Alu + PE-folie

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Blisterpakning bestående af OPA/Alu/PVC/Alu-folie

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Esomeprazol 2care4 indeholder:

- Aktivt stof: esomeprazol. 1 hård enterokapsel indeholder 40 mg esomeprazol (som magnesiumdihydrat).
- Øvrige indholdsstoffer: saccharose, majsstivelse, povidon K30, natriumlaurilsulfat, polyvinylalkohol, titandioxid (E171), macrogol 3000, macrogol 6000, talcum, tungt magnesiumcarbonat, methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1), og polysorbat 80 i de små kugler i kapselkernen og gelatine, titandioxid (E171) og rød jernoxid (E172) i kapselskallen. Se afsnit 2 "Esomeprazol 2care4 indeholder saccharose og natrium".

Udseende og pakningsstørrelser

Overdel og underdel af 40 mg hårde enterokapsler er kraftig lyserød. Kapslerne indeholder hvide til næsten hvide små kugler.

Kapslerne fås i æsker med 30, 60 og 100 kapsler i blisterpakninger.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:
2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V

Fremstiller:
2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2025.

Nedenstående oplysninger er kun til sundhedspersoner:

Administration gennem ernæringssonde (≥ 16 Ch)

1. Åben kapslen og hæld pellets i en passende sprøjte og fyld sprøjten med ca. 25 ml vand og ca. 5 ml luft. For nogle sonder kan opslæmning i 50 ml vand være nødvendig for at undgå at pellets tilstopper sonden.
2. Omryst sprøjten umiddelbart efter for at fordele granulatkornene jævnt i hele suspensionen.
3. Hold sprøjten med spidsen opad og check at spidsen ikke er stoppet til.
4. Fastgør sprøjten til sonden mens ovenstående position opretholdes.
5. Omryst sprøjten og vend den med spidsen pegende nedad. Injicér umiddelbart derefter 5-10 ml ind i sonden. Vend sprøjten om efter injektion og omryst (sprøjten skal holdes med spidsen opad for at undgå, at spidsen stopper til).
6. Vend sprøjten med spidsen nedad og injicér umiddelbart derefter yderligere 5-10 ml ind i sonden. Gentag denne procedure indtil sprøjten er tom.
7. Fyld sprøjten med 25 ml vand og 5 ml luft og gentag om nødvendigt trin 5 for at udskylle evt. tilbageværende bundfald. For nogle sonder kan det være nødvendigt med 50 ml vand.