

## **Indlægsseddel: Information til brugeren**

### **Dropizol 10 mg/ml orale dråber, opløsning** Morfin som opiumtinktur

**Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.**

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

#### **Oversigt over indlægssedlen**

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dropizol
3. Sådan skal du tage Dropizol
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

#### **1. Virkning og anvendelse**

Dropizol er et plantelægemiddel, der indeholder morfin.

Dropizol tilhører gruppen af lægemidler, der hedder antipropulsiva. Det anvendes til at behandle symptomer på svær diarré, når virkningen af andre behandlinger mod diarré ikke har haft den ønskede effekt.

Dropizol virker ved at hæmme tarmens bevægelse.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

#### **2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dropizol**

##### **Tag ikke Dropizol, hvis du:**

- er allergisk over for opium eller morfin eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i afsnit 6.
- er afhængig af opiater
- lider af grøn stær (forhøjet tryk inde i øjet)
- lider af en alvorlig lever- eller nyresygdom
- har alkoholabstinenser (delirium tremens)
- har alvorlig hovedtraume
- har risiko for at få paralytisk ileus (tarmslyng pga. lammelse af tarmmusklerne)

- har akut astma, KOL (en kronisk lungesygdom, der gør det svært at trække vejret), anden lungesygdom eller vejrtrækningsbesvær.
- har åndedrætsproblemer på grund af svær åndedrætsdepression. Din læge vil have fortalt dig, hvis du har nogen af disse tilstande. Symptomerne kan omfatte åndenød, hoste, langsommere eller svagere vejrtrækning end forventet
- lider af hjertesvigt ifm. en lungesygdom
- ammer.

### **Advarsler og forsigtighedsregler**

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Dropizol, hvis du:

- er ældre, da ældre mennesker reagerer forskelligt på dette lægemiddel. Dosis skal måske justeres
- har en kronisk nyre- og/eller leversygdom. Dosis skal måske justeres
- har en narkotikaafhængighed eller er alkoholiker
- har en galdeblæresygdom eller galdesten
- har en hovedskade eller forhøjet tryk i hjernen
- har nedsat bevidsthed
- tager medicin mod depression (moclobemid eller andre MAO-hæmmere) eller er stoppet. med at tage denne medicin inden for de sidste 2 uger
- har nedsat funktion af binyrerne
- har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen. Dosis skal måske justeres
- har lavt blodtryk med nedsat blodvolumen
- har inflammation i bugspytkirtlen
- har prostatahyperplasi (forstørret blærehalskirtel) og/eller sygdomme, der prædisponerer for besvær med at lade vandet og evt. vandladningsstop
- har en betændelse i eller inflammation af tarmene, da hæmning af tarmens bevægelse kan øge risikoen for optagelse af flere giftstoffer, forstørret tyktarm samt perforering af tarmene
- lider af epilepsi
- tager andre lægemidler mod diarré
- lider af krampeanfald
- har blødning i mave og/eller tarme
- tager medicin mod forhøjet blodtryk.

Hvis du får besvær med at lade vandet, bør du kontakte lægen eller sundhedspersonalet.

Dropizol anbefales ikke før operation eller inden for 24 timer efter operation pga. risikoen for tarmslyng. Symptomerne er kvalme og opkastning.

Der er risiko for afhængighed og tolerance ved brug af lægemidlet.

### **Tolerans og fysisk/psykisk afhængighed**

Dette lægemiddel indeholder morfin, som er et opioid. Gentagen brug af opioider kan medføre, at lægemidlet bliver mindre effektivt (din krop vænner sig til det, også kendt som tolerans). Gentagen brug af Dropizol kan også medføre fysisk/psykisk afhængighed og misbrug, som igen kan resultere i livstruende overdosering. Risikoen for disse bivirkninger kan stige i takt med, at dosen øges, og behandlingen forlænges.

Fysisk/psykisk afhængighed kan få dig til at føle, at du ikke længere har styr på, hvor stor en mængde lægemiddel du har brug for, eller hvor ofte du har brug for det.

Risikoen for at blive fysisk/psykisk afhængig varierer fra person til person. Du kan have større risiko for at blive fysisk/psykisk afhængig af Dropizol, hvis:

- Du eller nogen i din familie tidligere har misbrugt eller været afhængig af alkohol, receptpligtige lægemidler eller ulovlige stoffer ("været fysisk og psykisk afhængig").
- Du er ryger.
- Du tidligere har haft problemer med din sindstilstand (depression, angst eller en personlighedsforstyrrelse) eller er blevet behandlet af en psykiater for andre psykiske sygdomme.

Hvis du bemærker et eller flere af følgende symptomer, mens du tager Dropizol, kan det være et tegn på, at du er blevet fysisk/psykisk afhængig:

- Du er nødt til at tage lægemidlet i længere tid end din læge har anbefalet.
- Du har behov for at tage mere end den anbefalede dosis.
- Du anvender lægemidlet af andre årsager end dem, det er ordineret til, f.eks. "for at bevare roen" eller "hjælpe dig med at sove".
- Du har gentagne gange forgæves forsøgt at holde op med at tage lægemidlet eller begrænse brugen af det.
- Du bliver utilpas, når du holder op med at tage lægemidlet, og du får det bedre, når du begynder at tage lægemidlet igen ("abstinenser").

Hvis du opdager nogen af disse tegn, skal du kontakte lægen for at drøfte den bedste behandling for dig fremadrettet, herunder hvornår det er hensigtsmæssigt at stoppe, og hvordan stopper sikkert (se punkt 3, "Hvis du holder op med at tage Dropizol").

Der er rapporteret om akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP) i forbindelse med Dropizol-behandling. Symptomerne opstår sædvanligvis inden for de første 10 dage af behandlingen. Fortæl det til lægen, hvis du nogensinde har udviklet et alvorligt hududslæt eller hudafskalning, blæredannelse og/eller mundsår efter at have taget Dropizol eller andre opioider. Stop med at bruge Dropizol og søg straks lægehjælp, hvis du bemærker et eller flere af følgende symptomer: blæredannelse, udbredt skællende hud eller pusfyldte pletter sammen med feber.

#### Søvnrelaterede vejrtrækningsforstyrrelser

Dropizol kan forårsage søvnrelaterede vejrtrækningsforstyrrelser såsom søvnapnø (vejrtrækningspauser under søvn) og søvnrelateret hypoxæmi (lavt iltniveau i blodet). Symptomerne kan omfatte vejrtrækningspauser under søvn, afbrudt søvn på grund af åndenød, urolig søvn eller voldsom sløvhed i løbet af dagen. Hvis du eller en anden person observerer disse symptomer, skal du kontakte din læge. Lægen kan overveje at reducere dosen.

Kontakt lægen, hvis du oplever svære smerter i den øvre del af maven (som eventuelt stråler om i ryggen), kvalme, opkastning eller feber, da dette kan være symptomer forbundet med betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis) og galdevejene.

#### **Børn og unge**

Dropizol bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

#### **Brug af anden medicin sammen med Dropizol**

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er især vigtigt, at du taler med din læge eller apotekspersonalet, hvis du tager:

- Lægemidler, der forstærker den nedsatte bevidsthed og vejrtrækningsbesvær, der ses med Dropizol, som f.eks.:
  - alkohol
  - sovemedicin (f.eks. zolpidem) samt generel anæstesi (f.eks. barbiturater)
  - medicin mod depression (tricykliske depressionsmidler) eller Parkinsons sygdom (MAO-hæmmere f.eks. safinamid)
  - antipsykotisk medicin, der virker beroligende (f.eks. phenotiaziner)
  - medicin mod epilepsi og smerter som følge af nerveproblemer (gabapentin eller pregabalin)
  - medicin mod kvalme og opkastning (f.eks. bromoprid, meclizin, metoclopramid)
  - medicin mod allergi (antihistaminer f.eks. carbinoxamin, doxylamin))
  - andre smertestillende opiatere (f.eks. alfentanil, butorphanol, fentanyl, hydrocodone, hydromorphone, levorphanol, meperidine, methadone, oxycodone, oxymorphone, remifentanil, sufentanil, tapentadol, tramadol).
- Lægemidler, der virker på samme måde som morfin og kan dermed forstærke abstinenssymptomer og reducere den terapeutiske virkning (buprenorphin, nalbuphin, nalmefen, naltrexon, pentazocin).
- Medicin mod alkoholmisbrug (Antabus) eller medicin til behandling af visse typer af infektioner (metronidazol), da disse kan give ubehagelige bivirkninger som f.eks. rødme, hurtig vejrtrækning og hurtig puls.
- Medicin mod tuberkulose (rifampicin) nedsætter virkningen af morfin.
- Visse lægemidler, der bruges til at behandle blodpropper (f.eks. clopidogrel, prasugrel, ticagrelor), kan få en forsinket og nedsat virkning, når de tages sammen med opium
- Amfetamin og analoger kan nedsætte opioiders bedøvende virkning.
- Loxapin og periciazin kan øge opioiders bedøvende virkning.
- Samtidig brug af flibansering og opioider kan øge risikoen for sænkning af centralnervesystemet.
- Opioider kan øge plasmakoncentrationer af desmopressin og sertralin.
- Zidovudin (medicin mod hiv-infektioner).
- Medicin til behandling af depression (fluoxetin) kan nedsætte virkningsvarigheden af morfin.

Samtidig brug af Dropizol og beroligende medicin såsom benzodiazepiner eller beslægtede lægemidler øger risikoen for dødsrigdom, åndedrætsbesvær (luftvejsdepression), koma og kan være livstruende. På grund af dette bør samtidig brug kun overvejes, når andre behandlingsmuligheder ikke er mulige.

Hvis lægen imidlertid ordinerer Dropizol sammen med beroligende medicin, skal lægen begrænse dosis og varighed af samtidig behandling.

Fortæl lægen om alle beroligende lægemidler, som du tager, og følg nøje lægens dosisbefaling. Det kan være nyttigt at oplyse venner eller familiemedlemmer om at være opmærksomme på de ovenstående tegn og symptomer. Kontakt lægen, hvis du oplever sådanne symptomer.

Samtidig administration af morfin kan øge virkningen af lægemidler, der nedsætter dit blodtryk eller andre lægemidler, der har en sænkende virkning på dit blodtryk.

### **Brug af Dropizol sammen med mad, drikke og alkohol**

Dropizol kan tages sammen med mad og drikke.

Dropizol indeholder alkohol, så du bør udvise ekstra opmærksomhed ved indtagelse af alkohol.

### **Graviditet, amning og frugtbarhed**

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

#### **Graviditet**

Du må kun tage Dropizol efter aftale med lægen. Dropizol bør ikke anvendes tæt på termin pga. risikoen for abstinenssymptomer hos barnet ved fødslen.

#### **Amning**

Du må ikke tage Dropizol under amning.

#### **Frugtbarhed**

Det vides ikke, om morfin skader frugtbarheden. Fertile kvinder og mænd bør anvende sikker prævention, når de tager Dropizol.

#### **Trafik- og arbejdssikkerhed**



Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Dropizol virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Kør ikke efter du har taget medicin, før du ved, hvordan det påvirker dig.

#### **Dropizol indeholder ethanol**

Denne medicin indeholder 33 vol. % alkohol, dvs. op til 260 mg pr. dosis, svarende til 6,6 ml øl (5 vol. %) eller 2,8 ml vin (12 vol. %) pr. dosis. Skadelig for alkoholikere. Anvend kun denne medicin til børn, gravide og ammende kvinder og patienter i højrisikogruppe som patienter med epilepsi og leversygdomme efter aftale med lægen.

### **3. Sådan skal du tage Dropizol**

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

20 dråber svarer til 1 ml.

#### **Den sædvanlige dosis til voksne er**

Voksne: 5-10 dåber 2-3 gange daglig.

Enkeltdosis bør ikke overstige 1 ml og den totale daglige dosis bør ikke overstige 6 ml.

Ældre: Startdosis bør nedsættes.

#### **Nedsat leverfunktion**

Dropizol bør ikke anvendes eller dosis bør nedsættes. Se afsnit 2 "Tag ikke Dropizol" samt afsnit 2 "Advarsler og forsigtighedsregler".

#### **Nedsat nyrefunktion**


Dropizol bør ikke anvendes eller dosis bør nedsættes. Se afsnit 2 "Tag ikke Dropizol" samt afsnit 2 "Advarsler og forsigtighedsregler".

Der skal bruges 20 dråber til 1 ml.

### Sådan skal du tage Dropizol

Oral anvendelse

Dropizol kan anvendes ufortyndet eller blandet i et glas vand. Efter blanding med vand skal det straks drikkes. Hvis Dropizol anvendes ufortyndet, kan den korrekte dosis gives med en ske.



1. Åbning af børnesikkert lukning: Tryk ned og drej



2. Hold flasken lodret og dryp ned i en ske eller i et glas

### Brug til børn og unge

Dropizol bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

### Hvis du har taget for meget Dropizol

Hvis du har taget for meget Dropizol kan du få små pupiller, langsom hjerterytme, lavt blodtryk, vand i lungerne, vejrtrækningsbesvær samt bevidsthedssvækkelse, som kan føre til koma. Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Dropizol, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

### Hvis du har glemt at tage Dropizol

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

### Hvis du holder op med at tage Dropizol

**Fortsæt med at tage dette lægemiddel som anvist af lægen.**

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

## 4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Stop med at bruge Dropizol og søg straks lægehjælp, hvis du bemærker et eller flere af følgende symptomer:

### Alvorlige bivirkninger

**Almindelige bivirkninger** (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):

Vandladningsbesvær

**Ikke almindelige bivirkninger** (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):

Svækket vejrtrækning, træthed, angst, blåfarvning af læber, fingre og tæer, hovedpine, forvirring, krampeanfald og hævelse i ben og fødder (respirationsdæmpning). Ring 112.

Hjerterytmi (hurtig eller langsom puls)

**Ikke kendt** (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Svær hudreaktion med blæredannelse, udbredt skællende hud, pusfyldte pletter sammen med feber. Dette kan være en tilstand kaldet akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP).

### **Andre bivirkninger**

**Meget almindelige bivirkninger** (kan påvirke mere end 1 ud af 10 personer):

Døsighed, forstoppelse, mundtørhed

**Almindelige bivirkninger** (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):

Svimmelhed, hovedpine, små pupiller, kvalme og opkastning, appetitløshed, fordøjelsesbesvær eller -ubehag, ændringer i smag og lugt, nældefeber, svedtendens, bronkospasme, nedsat hosterefleks, slaphed

**Ikke almindelige bivirkninger** (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):

Ansigtserødem, kløe, urinvejskramper, forhøjede levertal

**Sjældne bivirkninger** (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer):

Stigning i bugspytkirtlenzymer (ses i en blodprøve) og betændelse i bugspytkirtlen, smerter på grund af nyrestein (nyrekolik) eller galdesten (galdekolik), abstinenssymptomer, ortostatisk hypotension (lavt blodtryk ved skift fra liggende eller siddende til stående stilling).

**Meget sjældne bivirkninger** (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

Vejrtrækningsbesvær, muskelkramper, krampeanfald, brændende og sviende smerte, øget følsomhed over for smerter, sløret syn, dobbeltsyn, ufrivillig bevægelse af øjet, en tilstand hvor tarmen ikke fungerer korrekt (ileus), mavesmerter, udslæt, hævelse i hænder, ankler eller fødder, utilpashed, kulderystelser, syndrom med uhensigtsmæssig sekretion af anti-diuretisk hormon (SIADH) (symptomer: kvalme, ildebefindende, hovedpine, udmattelse der i alvorlige tilfælde kan udvikle sig til krampeanfald og koma), udebleven menstruation.

**Ikke kendt** (hyppighed kan ikke estimeres ud fra de tilgængelige data):

Binyreinsufficiens (træthed, vægttab, besvimelse, lavt blodsukker, kvalme, diarré, opkast og mavesmerter), eufori (stærk følelse af velvære, lykke og spænding), ukontrollerede muskelbevægelser, afhængighed, dysforisk stemning (trist, uden energi), rastløshed, nedsat libido eller potens, hallucinationer, svimmelhed og feber.

### **Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt**

Eufori (stærk følelse af velvære, lykke og opstemthed), hjerterytmeforstyrrelse (for hurtig eller langsom hjerterytme) og ukontrollerede muskelbevægelser.

Søvnapnø (vejrtrækningspauser under søvn). Symptomer forbundet med betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis) og galdevejene, f.eks. svære smerter i den øvre del af maven (som eventuelt stråler om i ryggen), opkastning eller feber.

### **Indberetning af bivirkninger**

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen  
Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S  
Websted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

## 5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og flasken. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Efter åbning af flasken er holdbarheden 4 uger.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

## 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

### Dropizol 10 mg/ml orale dråber indeholder

- Aktivt stof/aktive stoffer: Opiumtinktur
- 1 ml oral opløsning indeholder 1 ml tinktur fra *Papaver somniferum L., succus siccus* (rå opium) svarende til 10 mg vandfrit morfin.

1 dråbe indeholder 50 mg opiumtinktur svarende til 0,5 mg (10 mg/ml) vandfrit morfin.

1 ml indeholder 20 dråber.

- Ekstraktionsmiddel: 33 % ethanol
- Øvrige indholdsstoffer: Ethanol 96 % vol., rensed vand.

### Udseende og pakningsstørrelser

Dropizol er en mørk, rødbrun væske i en brun glasflaske med dråbepipette og børnesikret låg.

Pakningsstørrelser: 1x10 ml, 2x10 ml, 3x10 ml, 4x10 ml, 5x10 ml og 10x10 ml

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

### Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pharmanovia A/S  
Ørestads Boulevard 108, 5  
DK-2300 København S  
Danmark  
E-mail: [info.nordics@pharmanovia.com](mailto:info.nordics@pharmanovia.com)

## **Fremstiller**

Lomapharm GmbH  
Langes Feld 5  
D-31860 Emmerthal  
Tyskland

Atnahs Pharma Denmark ApS  
Copenhagen Towers,  
Ørestads Boulevard 108, 5.tv,  
DK-2300 København S,  
Danmark

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

### **België/Belgique/Belgien**

Pharmanovia A/S  
Ørestads Boulevard 108, 5  
DK-2300 København S  
Denemarken/Danemark/Dänemark  
Tél/Tel: +45 33 33 76 33  
info.nordics@pharmanovia.com

### **Norge**

Pharmanovia A/S  
Ørestads Boulevard 108, 5  
DK-2300 København S  
Danmark  
Tlf: +45 33 33 76 33  
info.nordics@pharmanovia.com

### **Česká republika**

Pharmanovia A/S  
Ørestads Boulevard 108, 5  
DK-2300 København S  
Dánsko  
Tel: +45 33 33 76 33  
info.nordics@pharmanovia.com

### **Österreich**

Pharmanovia A/S  
Ørestads Boulevard 108, 5  
DK-2300 København S  
Dänemark  
Tel: +45 33 33 76 33  
info.nordics@pharmanovia.com

### **Danmark**

Pharmanovia A/S  
Ørestads Boulevard 108, 5  
DK-2300 København S  
Danmark  
Tlf: +45 33 33 76 33  
info.nordics@pharmanovia.com

### **România**

Pharmanovia A/S  
Ørestads Boulevard 108, 5  
DK-2300 København S  
Danemarca  
Tel: +45 33 33 76 33  
info.nordics@pharmanovia.com

### **Deutschland**

Pharmanovia A/S  
Ørestads Boulevard 108, 5  
DK-2300 København S  
Dänemark  
Tel: +45 33 33 76 33  
info.nordics@pharmanovia.com

### **Slovenská republika**

Pharmanovia A/S  
Ørestads Boulevard 108, 5  
DK-2300 København S  
Danska  
Tel: +45 33 33 76 33  
info.nordics@pharmanovia.com

### **Ireland**

Pharmanovia A/S  
Ørestads Boulevard 108, 5  
DK-2300 København S  
Denmark  
Tel: +45 33 33 76 33

### **Suomi/Finland**

Pharmanovia A/S  
Ørestads Boulevard 108, 5  
DK-2300 København S  
Tanska  
Puh/Tel: +45 33 33 76 33

info.nordics@pharmanovia.com

info.nordics@pharmanovia.com

### **Ísland**

Pharmanovia A/S  
Ørestads Boulevard 108, 5  
DK-2300 København S  
Danmörk  
Tel: +45 33 33 76 33  
info.nordics@pharmanovia.com

### **Sverige**

Pharmanovia A/S  
Ørestads Boulevard 108, 5  
DK-2300 København S  
Danmark  
Tel: +45 33 33 76 33  
info.nordics@pharmanovia.com

### **Magyarország**

Pharmanovia A/S  
Ørestads Boulevard 108, 5  
DK-2300 København S  
Dánia  
Tel: +45 33 33 76 33  
info.nordics@pharmanovia.com

### **United Kingdom**

Pharmanovia A/S  
Ørestads Boulevard 108, 5  
DK-2300 København S  
Denmark  
Tel: +45 33 33 76 33  
info.nordics@pharmanovia.com

### **Nederland**

Pharmanovia A/S  
Ørestads Boulevard 108, 5  
DK-2300 København S  
Denemarken  
Tel: +45 33 33 76 33  
info.nordics@pharmanovia.com

### **Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:**

Belgien	Dropizole 10 mg/ml druppels voor oral gebruik, oplossing
Danmark	Dropizol 10 mg/ml orale dråber, opløsning
Finland	Dropizol 10 mg/ml tipat, liuos
Holland	Dropizol 10 mg/ml druppels voor oraal gebruik, oplossing
Irland	Dropizol 10 mg/ml oral drops, solution
Island	Dropizol 10 mg/ml dropar til inntöku, lausn
Norge	Dropizol 10 mg/ml dråper, oppløsning
Rumænien	Dropizol 10 mg/ml picături orale, soluție
Slovakiet	Dropizol 10 mg/ml perorálne roztokové kvapky
Storbritannien	Dropizol 10 mg/ml oral drops, solution
Sverige	Dropizol, 10 mg/ml orala droppar, lösning
Tjekkiet	Dropizol 10 mg/ml Perorální kapky, roztok
Tyskland	Dropizol 10 mg/ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung
Ungarn	Dropizol 10 mg/ml belsőleges oldatos cseppek
Østrig	Dropizol 10 mg/ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung
Italien	Dropizole 10 mg/ml gocce orali, soluzione
Luxembourg	Dropizol 10 mg/ml, solution buvable en gouttes
Portugal	Dropizale 10 mg/ml gotas orais, solução
Frankrig	Dropizal 10 mg/ml, solution buvable en gouttes
Spanien	Dropizol 10 mg/ml gotas orales en solución

**Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2024**