

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zolpidem 2care4 10 mg, filmovertrukne tabletter

zolpidemtartrat

04-2023
P468569-8

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zolpidem 2care4
3. Sådan skal du tage Zolpidem 2care4
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zolpidem 2care4 anvendes til kortvarig behandling af søvnløshed hos voksne.

Det må ikke anvendes til langvarig behandling. Behandlingsvarigheden bør være så kort som mulig, da risikoen for afhængighed stiger med varigheden af behandlingen.

Det anvendes kun, hvis søvnløsheden er svær, invaliderende eller er til stor gene for patienten.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zolpidem 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Zolpidem 2care4

- hvis du er **allergisk** over for zolpidem eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)
- hvis du lider af **en sygdom med muskelsvaghed** (myastenia gravis)
- hvis du har **korte pauser i vejrtrækningen**, når du sover (søvnapnøsyndrom)
- hvis du har **akut og/eller svært nedsat vejrtrækningsfunktion** (respiratorisk insufficiens)
- hvis du har **svær leverskade** (leverinsufficiens).
- hvis du nogensinde har gået i søvne eller har udvist anden unormal adfærd i søvne efter at have taget Zolpidem 2care4 eller et andet lægemiddel, der indeholder zolpidem. Det kan f.eks. være at køre bil, spise, foretage telefonopkald eller have sex uden at være helt vågen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Zolpidem 2care4.

Generelt

Før behandlingen med Zolpidem 2care4

- skal årsagen til søvnforstyrrelserne og muligheden for at behandle dem uden lægemidler klarlægges
- skal underliggende sygdomme behandles

Hvis der ikke er nogen forbedring i søvnforstyrrelsen efter

7-14 dages behandling med Zolpidem 2care4, vil lægen foretage yderligere undersøgelser for at klarlægge årsagerne til søvnforstyrrelsen.

Tilvænning

Gentagen brug af søvnfremkaldende midler over nogle uger kan medføre **nedsat virkning** (tilvænning).

Afhængighed

Brug af Zolpidem 2care4 kan medføre misbrug og/eller fysisk og psykologisk afhængighed. Risikoen for afhængighed stiger i takt med dosis og behandlingsvarighed, og den er højere, hvis Zolpidem 2care4 anvendes i mere end 4 uger. Risikoen for misbrug og afhængighed er højere hos patienter med psykiske forstyrrelser og/eller alkohol-, stof- eller lægemiddelmisbrug i sygehistorien. Fortæl det til lægen, hvis du nogensinde har haft en psykisk forstyrrelse, eller hvis du har misbrugt eller været afhængig af alkohol, stoffer eller lægemidler.

Abstinenssymptomer

Hvis der er udviklet fysisk afhængighed, vil et pludseligt ophør med behandlingen medføre abstinenssymptomer, såsom hovedpine, muskelsmerter, usædvanlig angst og anspændthed, rastløshed, forvirring og irritabilitet. I svære tilfælde kan der ses manglende virkelighedssans, personlighedsforstyrrelser, høreforstyrrelser (forstærkning af hørelsen), følelsesløshed og prikken i arme og ben, overfølsomhed over for lys, støj og berøring, hallucinationer eller epileptiske krampeanfald. Derfor anbefales det at stoppe behandlingen ved at reducere dosen gradvist. I nogle tilfælde kan zolpidem også medføre abstinenssymptomer i perioden mellem to doser.

Når behandlingen **ophører**, kan der opstå midlertidige **abstinenssymptomer**, og **de symptomer, der var årsag til behandlingen med Zolpidem 2care4, kan vende tilbage i sværere grad**. Ledsagende symptomer omfatter humørforandringer, angst og rastløshed. Da risikoen for abstinens- eller ophørssymptomer er størst efter brat ophør af behandlingen, anbefales det, at behandlingen stoppes ved gradvis nedtrapning af dosis.

Når Zolpidem 2care4 anvendes i den anbefalede dosis og behandlingsvarighed og under hensyntagen til advarslerne og forsigtighedsreglerne, er forekomsten af abstinens- eller ophørssymptomer ved afslutning af behandlingen minimal.

Zolpidem 2care4 bør ikke anvendes som basisbehandling for visse psykiske sygdomme (psykoser).

Selvordstanker/selvordsforsøg/selvord og depression

Ligesom andre søvnfremkaldende eller beroligende midler bør Zolpidem 2care4 anvendes med forsigtighed hos patienter med symptomer på **depression** eller angst ledsaget af depression. I visse situationer kan symptomerne på depression tiltage, hvis den underliggende sygdom ikke bliver tilstrækkeligt behandlet med passende lægemidler (antidepressiva). Det kan øge risikoen for selvmord hos sådanne patienter. Tidligere uopdaget depression kan træde frem under behandling med Zolpidem 2care4. Nogle studier har vist en øget forekomst af selvmord eller selvmordsforsøg hos patienter, der tager sovepiller eller beroligende midler, herunder Zolpidem 2care4.

Det er imidlertid ikke blevet klarlagt, om det skyldes lægemiddelbehandlingen, eller om der kan være andre årsager.

Søg straks lægehjælp, hvis du får selvmordstanker (tanker om at skade eller tage livet af dig selv) eller selvmordsadfærd.

Hukommelsestab (amnesi)

Søvnfremkaldende midler kan forårsage tidsbegrænsede hukommelsestab (anterograd amnesi). Det betyder, at du (som regel nogle få timer) efter indtagelse af dette lægemiddel kan gøre ting, som du ikke kan huske senere. Dette kan også omfatte upassende adfærd. Risikoen afhænger af dosisniveauet. For at minimere denne risiko bør du sikre dig, at du kan få 8 timers uafbrudt søvn.

Psykiske og paradoksale reaktioner

Zolpidem 2care4 kan, særligt hos ældre patienter, forårsage **psykiske og såkaldte "paradoksale reaktioner"**, såsom indre rastløshed, øgede søvnforstyrrelser, uro, irritabilitet, aggressivitet, vrangforestillinger, raserianfald, mareridt, hallucinationer (at se, høre eller føle ting, der ikke er der), usædvanlig adfærd og andre adfærdsforstyrrelser (se afsnit 4). Hvis det sker, bør behandlingen med Zolpidem 2care4 stoppes (se afsnit 4).

Søvnøgængeri

Der er set **søvnøgængeri og anden unormal søvnadfærd** hos patienter, der havde taget zolpidem, og som ikke var helt vågne. Dette omfatter "søvnørstel", tilberedning og indtagelse af mad, telefonopkald eller samleje, som patienterne ikke kan huske, når de vågner. Hvis du oplever noget af førnævnte, skal du straks stoppe med at tage Zolpidem 2care4 og kontakte lægen, da denne unormale søvnadfærd kan være til alvorlig fare for dig selv og andre. Hvis du tager Zolpidem 2care4 og samtidigt drikker alkohol eller tager andre lægemidler, der gør dig døsig, kan det øge risikoen for, at du oplever unormal søvnadfærd.

Psykomotorisk hæmning

Psykomotorisk hæmning den efterfølgende dag (se også Trafik- og arbejdssikkerhed)

Lige som andre søvnfremkaldende eller beroligende lægemidler kan Zolpidem 2care4 hæmme centralnervesystemet.

Dagen efter du har taget Zolpidem 2care4, kan risikoen for psykomotorisk hæmning, herunder forringet køreevne, øges, hvis:

- du tager dette lægemiddel mindre end 8 timer før, du udfører aktiviteter, der kræver din opmærksomhed
- du tager en højere dosis end den anbefalede
- du tager zolpidem samtidig med, at du tager andre lægemidler, der hæmmer centralnervesystemet, eller andre lægemidler, der øger indholdet af zolpidem i blodet, eller hvis du samtidig drikker alkohol eller tager stoffer eller lægemidler.

Tag hele dosen umiddelbart før sengetid.

Du må ikke tage en ekstra dosis i løbet af natten.

Brug af zolpidem er blevet forbundet med en øget risiko for **faldulykker**. Faldulykker kan skyldes bivirkninger, såsom koordinationsproblemer, muskelsvaghed, svimmelhed, døsigthed og træthed. Risikoen for faldulykker er højere hos ældre patienter, og hvis der anvendes en højere dosis end anbefalet.

Nedsat vejrtræknings- og leverfunktion

Patienter med kronisk nedsat vejrtrækningsfunktion eller leverfunktionsforstyrrelser bør behandles med forsigtighed, og din læge vil muligvis ordinere en lavere dosis af Zolpidem 2care4 (se også afsnit 3). På grund af en risiko for hjerneskade bør patienter med svært nedsat leverfunktion ikke behandles med Zolpidem 2care4.

Ledningsforstyrrelser i hjertet

Patienter med en bestemt type ledningsforstyrrelse i hjertet ("**langt QT-syndrom**") bør behandles med forsigtighed. Lægen vil nøje afveje fordele og risici inden behandling med Zolpidem 2care4.

Ældre og svækkede patienter

De bør have en lavere dosis (se afsnit 3). Hos ældre patienter er forsigtighed nødvendig på grund af risikoen for faldulykker, især hvis de står op om natten.

Børn og unge

Zolpidem 2care4 bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år, da der er utilstrækkelige kliniske data vedrørende brug i denne aldersgruppe.

Brug af andre lægemidler sammen med Zolpidem 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.

Følgende lægemidler kan påvirke virkningen af Zolpidem 2care4, eller Zolpidem 2care4 kan påvirke deres virkning:

Hvis du tager følgende lægemidler sammen med zolpidem, kan døsigthed og psykomotorisk hæmning, herunder forringet køreevne, være øget den efterfølgende dag:

- lægemidler til behandling af psykiske problemer (antipsykotika)
- lægemidler til behandling af søvnproblemer (søvnfremkaldende lægemidler)
- lægemidler, der virker beroligende eller mod angst
- lægemidler til behandling af depression

- lægemidler til behandling af moderate til stærke smerter (narkotiske analgetika)
- lægemidler mod epilepsi
- lægemidler brugt til bedøvelse
- lægemidler til behandling af høfeber, udslæt eller anden allergi, som kan gøre dig søvngig (sløvende antihistaminer)

Samtidig anvendelse af Zolpidem 2care4 og opioider (stærke smertestillende lægemidler, lægemidler til substitutionsbehandling og visse lægemidler mod hoste) øger risikoen for dødsghed, vejrtrækningsbesvær (respirationsdepression), dyb bevidstløshed (koma) og kan være livstruende. På grund af dette bør samtidig anvendelse kun overvejes, når der ikke findes andre behandlingsmuligheder.

Hvis din læge alligevel ordinerer Zolpidem 2care4 sammen med opioider, bør lægen begrænse dosis og behandlingsvarigheden.

Fortæl din læge om alle de lægemidler du tager, som indeholder opioid, og følg nøje lægens anvisninger vedrørende dosering. Det kan være nyttigt at informere dine venner eller pårørende om, at de skal være opmærksomme på ovenstående tegn og symptomer. Kontakt din læge, hvis du oplever disse symptomer.

Samtidig anvendelse af Zolpidem 2care4 og smertestillende lægemidler af opiat-typen (narkotiske analgetika) kan også føre til hurtigere udvikling af afhængighed.

Hvis du bruger zolpidem sammen med lægemidler mod depression, herunder bupropion, desipramin, fluoxetin, sertalin og venlafaxin, kan du opleve at se ting, der ikke findes (hallucinationer).

Det frarådes at tage zolpidem sammen med fluvoxamin eller ciprofloxacin.

Virkningen af muskelafslappende midler kan øges ved samtidig brug af zolpidem, især hos ældre patienter og ved brug af høje doser (risiko for faldulykker!).

Lægemidler, der øger aktiviteten af visse leverenzymmer (især P450-isoenzym CYP3A4), kan svække virkningen af Zolpidem 2care4 (f.eks. rifampicin, carbamazepin, phenytoin, perikon). Samtidig brug af zolpidem og perikon frarådes.

Omvendt kan visse lægemidler mod svamp (svampemidler af azol-typen, f.eks. ketoconazol) og visse antibiotika (makrolid-antibiotika), som nedsætter virkningen af disse leverenzymmer, øge virkningen af Zolpidem 2care4.

Brug af Zolpidem 2care4 sammen med mad, drikke og alkohol

Du bør ikke indtage alkohol under behandlingen, da det ændrer og øger virkningen af zolpidem på uforudsigelig vis. Det vil også påvirke evnen til at udføre opgaver, der kræver øget koncentration. Grapefrugtjuice kan øge virkningen af Zolpidem 2care4.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Graviditet

Det frarådes at anvende Zolpidem 2care4 i graviditeten. Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds. Hvis det anvendes i graviditeten, er der risiko for, at det påvirker barnet.

Nogle studier tyder på, at der kan være en øget risiko for læbe-gane-spalte (også kaldet "hareskår") hos det nyfødte barn.

Brug af Zolpidem 2care4 i andet og/eller tredje graviditetstrimester kan medføre nedsat fosterbevægelse og pulsvariation hos fosteret.

Brug af Zolpidem 2care4 i slutningen af graviditeten eller under fødslen kan medføre muskelsvaghed, lavere kropstemperatur, problemer med fødeindtagelse og vejrtrækningsproblemer (hæmmet vejrtrækning) hos det nyfødte barn.

Regelmæssig brug af dette lægemiddel sent i graviditeten kan medføre fysisk afhængighed hos barnet, som kan have risiko for abstinenssymptomer, såsom uro eller rysten. I så tilfælde skal det nyfødte spædbarn overvåges nøje efter fødslen.

Amning

Da zolpidem udskilles i små mængder i modermælken, bør Zolpidem 2care4 **ikke indtages under amning**.

Frugtbarhed

Der foreligger ingen data vedrørende virkningen på frugtbarhed.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Zolpidem 2care4 kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Zolpidem 2care4 påvirker i væsentlig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner, med risiko for adfærd såsom søvngængerier eller kørsel i overtræt tilstand ("søvn-kørsel"). Dagen efter, at du har taget Zolpidem 2care4 (eller andre lægemidler mod søvnløshed), skal du være opmærksom på, at:

- Du kan føle dig døsig, søvngig, svimmel eller forvirret
- Din reaktionsevne kan være nedsat
- Dit syn kan være sløret, eller du kan se dobbelt
- Du kan være mindre opmærksom.

For at minimere disse virkninger anbefales det, at der er mindst 8 timer mellem indtagelse af Zolpidem 2care4 og kørsel, betjening af maskiner og arbejde i højder.

Du må ikke drikke alkohol eller tage andre psykoaktive stoffer, når du tager Zolpidem 2care4, da det kan forstærke ovennævnte virkninger.

Zolpidem 2care4 indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Zolpidem 2care4 indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natrium-frit.

3. Sådan skal du tage Zolpidem 2care4

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er

Voksne

Den anbefalede dosis er 10 mg (1 fillovertrukket tablet) Zolpidem 2care4 i løbet af 24 timer. Nogle patienter kan få ordineret en lavere dosis. Zolpidem 2care4 skal tages:

- som en enkelt dosis
- umiddelbart før sengetid.

Du skal sørge for, at der går mindst 8 timer, fra du tager denne medicin, til du udfører aktiviteter, der kræver din opmærksomhed.

Tag ikke mere end 10 mg i løbet af 24 timer.

Ældre og svækkede patienter

Den anbefalede dosis Zolpidem 2care4 til ældre og svækkede personer er 1/2 fillovertrukket tablet (5 mg), da disse personer kan være særligt følsomme over for Zolpidem 2care4. Denne dosis bør kun øges til 10 mg (1 fillovertrukket tablet), hvis virkningen er utilstrækkelig, og lægemidlet tåles godt.

Nedsat vejrtrækningsfunktion eller leverfunktion

Patienter med nedsat vejrtrækningsfunktion eller nedsat leverfunktion bør kun have en dosis på ½ fillovertrukket tablet (5 mg) af Zolpidem 2care4.

Brug til børn og unge

Det frarådes at anvende Zolpidem 2care4 til børn og unge under 18 år, da der ikke forligger tilstrækkelige kliniske data vedrørende brug i denne aldersgruppe.

Indtagelsesmåde

Zolpidem 2care4 bør tages med væske (vand) umiddelbart inden sengetid eller i sengen.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

Hvor længe skal du tage Zolpidem 2care4?

Behandlingsvarigheden bør være så kort som mulig. Generelt bør behandlingen vare fra nogle få dage til 2 uger, og den bør ikke vare mere end 4 uger inklusive nedtrappingsperioden.

I enkeltstående tilfælde kan det være nødvendigt at forlænge behandlingen ud over denne periode, men det bør ikke ske, uden at lægen revurderer din tilstand.

Hvis du har taget for meget Zolpidem 2care4

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Zolpidem 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Tegnene på (let) overdosering kan omfatte døsighed, svimmelhed, sløret syn, sløret tale, blodtryksfald, usikker gang og bevægelse, muskelsvaghed, mental forvirring og hallucinationer. I tilfælde af svær forgiftning kan der opstå dyb søvn til bevidstløshed, uro, nedsat vejrtrækningsfunktion og kredsløbskollaps. Der er rapporteret om tilfælde af overdosering af zolpidem (alene eller i kombination med andre midler, der hæmmer centralnervesystemet, herunder alkohol) med alvorlige konsekvenser (inklusive dødelige tilfælde).

Hvis du har glemt at tage Zolpidem 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt med at tage Zolpidem 2care4 som ordineret af din læge.

Hvis du holder op med at tage Zolpidem 2care4

Hvis du ønsker at afbryde behandlingen, skal du drøfte det med lægen først. Stop ikke med at bruge lægemidlet på egen hånd uden lægelig rådgivning. Eftersom risikoen for abstinenssymptomer er højere efter brat behandlingsophør, vil lægen råde dig til at stoppe behandlingen ved at nedtrappe dosen gradvist. Se afsnit 2, "Advarsler og forsigtighedsregler", "Abstinenssymptomer".

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop brugen af Zolpidem 2care4, og kontakt omgående lægen, eller tag på hospitalet med det samme, hvis:

Du får en **allergisk reaktion (angioødem)**. Tegnene herpå omfatter: kløende, hævet udslæt (nældefeber), hævelse af hænder, fødder, ankler, ansigt, læber eller svælg, hvilket kan forårsage synke- eller vejrtrækningsbesvær.

Der er tegn på, at forekomsten af bivirkninger er dosisafhængig. Det gælder især bivirkninger relateret til centralnervesystemet. For at reducere disse bivirkninger bør zolpidem tages lige inden sengetid eller i sengen, som anbefalet. Bivirkninger er mere almindelige hos ældre patienter.

Kontakt lægen så hurtigt som muligt, hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger:

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter

- døsighed
- forværret søvnløshed
- mareridt
- træthed
- hovedpine
- svimmelhed
- kognitive forstyrrelser, såsom midlertidigt hukommelsestab (anterograd amnesi, som kan være forbundet med upassende adfærd)
- hallucinationer
- øget aktivitet

- depression
- diarré
- kvalme eller opkastning
- mavesmerter
- infektion i de øvre luftveje
- infektion i de nedre luftveje
- følelseslammelse
- rygsmerter.

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter

- appetitforstyrrelser
- forvirring
- irritabilitet
- rastløshed
- aggressivitet
- søvngængerier eller anden adfærd, som ikke er normal, når man sover, såsom at køre bil, spise, foretage telefonopkald eller have sex uden at være helt vågen (se afsnittet "Advarsler og forsigtighedsregler")
- ekstrem lykkefølelse
- føleforstyrrelser såsom snurrende fornemmelse eller følelsesløshed (paræstesi)
- rysten
- opmærksomhedsforstyrrelser
- taleforstyrrelse
- dobbeltsyn
- sløret syn
- øgede leverenzymmer
- udslæt
- kløe (pruritus)
- øget svedproduktion (hyperhidrose)
- ledsmerter
- muskelsmerter
- muskelkramper
- nakkesmerter
- muskelsvaghed.

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter

- ændret sexlyst
- leverskade (hepatocellulær, kolestatisk eller blandet) (se også afsnit 2 "Det skal du vide, før du begynder at tage Zolpidem 2care4" og afsnit 3)
- nældefeber (urticaria)
- usikker gang
- nedsat bevidsthedsniveau.

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter

- forestillinger i strid med virkeligheden (vrangforestillinger)
- nedsat syn
- afhængighed (abstinens- eller ophørssymptomer kan forekomme efter behandlingsophør)
- svækket vejrtrækning (respirationsdepression).

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)

- raserianfald
- unormal adfærd
- psykoser
- tilvænning (nedsat virkning af lægemidlet)
- vedvarende hævelse af hud og slimhinder (angioødem)
- risiko for faldulykker (særligt hos ældre patienter, eller hvis Zolpidem 2care4 ikke bliver taget som anvist)
- misbrug.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Zolpidem 2care4 utilgængeligt for børn.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Tag ikke Zolpidem 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zolpidem 2care4 indeholder:

- Aktivt stof: zolpidemtartrat.
En tablet indeholder 10 mg zolpidemtartrat.
- Øvrige indholdsstoffer:
Tabletkerne: succinsyre, natriumstivelsesglycolat (type A), mikrokrySTALLINSK cellulose, lactosemonohydrat, magnesiumstearat, kolloid siliciumdioxid.
Tabletøvrtræk: lactosemonohydrat, makrogol 4000, hypromellose og titaniumdioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Zolpidem 2care4 er hvide, aflange og hvælvede filmovertrukne tabletter med en delekærv.

Pakningsstørrelser

Zolpidem 2care4 fås i pakningsstørrelser á 10, 15 (indeholder et delt blisterkort), 20 og 100 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringsstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

Zolpidem 2care4 svarer til Zolpidem Hexal.

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2023.