

Indlægsseddel: Information til brugeren

Atenolol 2care4 50 mg og 100 mg tabletter

atenolol

06-2024
P434341-2

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Atenolol 2care4
3. Sådan skal du tage Atenolol 2care4
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Atenolol 2care4 er et hjerte- og blodtrykslægemiddel (betablokker). Atenolol 2care4 virker ved at sænke blodtrykket og stabilisere hjerterytmen.

Du kan tage Atenolol 2care4:

- Ved forhøjet blodtryk.
- Ved uregelmæssig hurtig hjerterytme.
- Til forebyggelse af hjertekramper (angina pectoris).
- Ved blodprop i hjertet.
- Som forebyggende behandling efter blodprop i hjertet.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Atenolol 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Atenolol 2care4 hvis du

- er allergisk over for atenolol, andre betablokkere eller et af de øvrige indholdsstoffer i Atenolol 2care4 (angivet i afsnit 6).
- har sygdom i hjerte og pulsårer. Tal med lægen.
- har svær astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger).
- har en ubehandlet svulst i binyrerne og/eller får anfald af højt blodtryk pga. en svulst i binyrerne.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Atenolol 2care4.

Tal med lægen, hvis du:

- Får meget lav puls.
- Har kolde, hvide og følelsesløse fingre og tæer (Raynauds syndrom).
- Har smerter i benene pga. dårligt blodomløb (claudicatio intermittens).
- Får længerevarende hjertekramper (Prinzmetals angina).
- Har diabetes.
- Har astma.
- Tidligere har haft allergiske reaktioner.
- Eller din nærmeste familie har psoriasis.
- Har en alvorligt nedsat nyrefunktion.
- Har forhøjet stofskifte.

Oplys altid ved operation eller bedøvelse, at du er i behandling med Atenolol 2care4.

Brug af andre lægemidler sammen med Atenolol 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Atenolol 2care4, og Atenolol 2care4 kan påvirke virkningen af andre lægemidler.

Tal med lægen, hvis du tager følgende lægemidler:

- Lægemidler mod hjerte- og kredsløbslidelser (verapamil, diltiazem, nifedrin, kinidin, amiodaron, lidocain, methyldopa, hjerteglykosider).
- Lægemidler mod migræne og hestigninger (clonidin).
- Smertestillende lægemidler (NSAID), (f.eks. ibuprofen, indometacin, naproxen).
- Insulin eller tabletter mod diabetes.
- Lægemidler mod depression (MAO-hæmmere, tricykliske antidepressiva).
- Lægemidler mod epilepsi (barbiturater).
- Lægemidler mod psykoser (phenothiaziner).
- Narkotika (stoffer, der dæmper funktionen af centralnervesystemet, det kan f.eks. være kraftigt smertestillende lægemidler såsom morfin eller morfinlignende lægemidler).

Brug af Atenolol 2care4 sammen med mad og drikke

Du kan tage Atenolol 2care4 sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke tage Atenolol 2care4. Tal med din læge.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Atenolol 2care4, da atenolol bliver udskilt i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Atenolol 2care4 kan give svimmelhed og træthed, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Atenolol 2care4 indeholder lactose og natrium

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.

3. Sådan skal du tage Atenolol 2care4

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Atenolol 2care4 50 mg

Voksne:

- Forhøjet blodtryk, uregelmæssig hurtig hjerterytme, forebyggelse af hjertekramper (angina pectoris): 1-2 tabletter (50-100 mg) 1 gang daglig.
- Akut blodprop i hjertet: Dosis er individuel. Følg lægens anvisninger.
- Forebyggelse efter blodprop i hjertet: Dosis er individuel. Normal dosis er sædvanligvis 1-2 tabletter (50-100 mg) daglig. Følg lægens anvisninger.

Atenolol 2care4 100 mg

Voksne:

- Forhøjet blodtryk, uregelmæssig hurtig hjerterytme, forebyggelse af hjertekramper (angina pectoris): ½–1 tablet (50–100 mg) 1 gang daglig.
- Akut blodprop i hjertet: Dosis er individuel. Følg lægens anvisninger.
- Forebyggelse efter blodprop i hjertet: Dosis er individuel. Normal dosis er sædvanligvis ½–1 tablet (50–100 mg) daglig. Følg lægens anvisninger.

Brug til børn: Du må ikke give Atenolol 2care4 til børn. Følg lægens anvisninger.

Ældre: Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyrefunktion: Det kan være nødvendigt at justere dosis, hvis dine nyrer fungerer meget dårligt. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion: Det er ikke nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du skal bedøves eller opereres, kan det være nødvendigt at stoppe behandlingen 1 døgn før. Følg lægens anvisninger.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har taget for meget Atenolol 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Atenolol 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering kan være meget langsom puls, besvimelse, hjerterest, vejrtrækningsbesvær, opkastning, blåfarvning af hud og slimhinder.

Hvis du har glemt at tage Atenolol 2care4

Hvis du har glemt en dosis Atenolol 2care4, tag den, så snart du kommer i tanke om det. Er det tæt på tidspunktet for næste dosis, spring da den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Atenolol 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du skal holde op med behandlingen, skal det ske gradvist over 1–2 uger. Tal med lægen.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

- **Sjældne bivirkninger** (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
Alvorlige forandringer i blodet, der viser sig ved træthed, feber, blødning fra hud og slimhinder, blå mærker.
Hallucinationer, psykoser. Forværring af hjerteproblemer.
Leversygdom. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger:

- **Almindelige bivirkninger** (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
Langsom puls, kolde hænder og fødder. Lavt blodtryk. Kvalme, opkastning, diarré, forstoppelse. Muskelsvaghed, træthed, øget svedtendens.
- **Ikke almindelige bivirkninger** (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):
Søvnforstyrrelser. Forhøjede levertal.
- **Sjældne bivirkninger** (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
Forværring af en ikke kendt diabetes. Mareridt, depression, forvirring, angst. Svimmelhed, hovedpine, følelse af brænden, kløen og prikken i huden. Øjentørhed, synsforstyrrelser. Besvimelse pga. meget lavt blodtryk, smerter i benene, hvide fingre og tæer. Åndedrætsbesvær hos

astmatikere. Mundtørhed. Hårtab, udslæt, mindre blødninger i hud og slimhinder, kløe, forværring af psoriasis. Muskelkramper. Impotens. Besvimelse, væskeophobninger i arme og/eller ben, brystmerter.

- **Meget sjældne bivirkninger** (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):
Nedsat sexlyst. Forøget forekomst af antinukleære antistoffer (ANA).

- **Hypigheden ikke kendt:**

For lavt blodsukker, sløring af sygdom i skjoldbruskkirtlen, lupus lignende syndrom (tilstand med hududslæt og betændelse i bindevæv, led og organer).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Atenolol 2care4 utilgængeligt for børn.

Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys og fugt.

Tag ikke Atenolol 2care4 efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterkortet efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Atenolol 2care4 50 mg indeholder:

- Aktivt stof: Atenolol. 1 tablet indeholder 50 mg atenolol.
- Øvrige indholdsstoffer: Majsstivelse, pregelatineret stivelse, lactosemonohydrat, povidon, natriumlaurylsulfat, vandfri kolloid silica og magnesiumstearat.

Atenolol 2care4 100 mg indeholder:

- Aktivt stof: Atenolol. 1 tablet indeholder 100 mg atenolol.
- Øvrige indholdsstoffer: Majsstivelse, pregelatineret stivelse, lactosemonohydrat, povidon, natriumlaurylsulfat, vandfri kolloid silica og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Atenolol 2care4 50 mg og 100 mg tabletter er runde, hvide og hvælvede tabletter mærket henholdsvis "C24" og "C25". Tabletterne har delekærv.

Pakningsstørrelser

100 tabletter.

Indehaver af markeds-

føringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V

Fremstillere:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2024.