

Indlægsseddel: Information til patienten

Sumatriptan Viatris 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter

sumatriptansuccinat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
- Lægen har ordineret Sumatriptan Viatris tabletter til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sumatriptan Viatris
3. Sådan skal du tage Sumatriptan Viatris
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Sumatriptan Viatris indeholder det aktive stof sumatriptansuccinat. Sumatriptan Viatris er en medicin mod migræne og anvendes til behandling af en kraftig form for hovedpine kaldet migræneanfald, med eller uden syns- eller føleforstyrrelser også kaldet aura.

Du må kun anvende Sumatriptan Viatris, hvis du oplever tegn eller symptomer på migræneanfald.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sumatriptan Viatris

Tag ikke Sumatriptan Viatris

- hvis du er allergisk over for sumatriptan eller et af de øvrige indholdsstoffer i Sumatriptan Viatris (angivet i afsnit 6),
- hvis du er overfølsom over for en type antibiotika, der kaldes sulfonamider (som f.eks. trimetoprim og sulfamethoxazol),
- hvis du har eller tidligere har haft hjertelidelser, blodprop i hjertet, tegn eller symptomer på koronar hjertelidelse eller angina pectoris,
- hvis du har perifer vaskulær lidelse (forsnævring af de blodkar, der sørger for blodtilførslen til arme og ben),
- hvis du tidligere har haft en blodprop eller blødning i hjernen eller hvis du har haft kortvarige symptomer på en blodprop, som du kom helt over (transient iskæmisk tilfælde),
- hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion,
- hvis du lider af usædvanlige former for migræne, som er forårsaget af lidelser i hjernen eller øjnene (f.eks. hemiplegisk migræne, basilaris type migræne eller ophthalmoplegisk migræne),
- hvis du har moderat eller meget højt blodtryk eller mildt ubehandlet forhøjet blodtryk,
- hvis du samtidig tager eller inden for de sidste 24 timer har taget ergotaminholdig medicin eller ergotaminderivater (herunder methysergid) til behandling af migræne (se "Brug af andre lægemidler sammen med Sumatriptan Viatris")

- hvis du tager eller inden for de sidste 24 har taget andre lægemidler mod migræne kaldet triptaner som f.eks. naratriptan eller zolmitriptan. Se ”Brug af andre lægemidler sammen med Sumatriptan Viatriis”.
- hvis du tager eller inden for de sidste 2 uger har taget monoaminooxidasehæmmere (kaldet MAO-hæmmere) til behandling af depression eller Parkinsons sygdom.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Advarsler og forsigtighedsregler

Sumatriptan Viatriis kan forårsage trykken for brystet og i halsen.

Du kan få smerter eller trykken for brystet og i halsen efter du har taget Sumatriptan Viatriis. Hvis symptomerne ikke forsvinder efter kort tid, skal du straks kontakte lægen.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Sumatriptan Viatriis:

- hvis du er i risikogruppen for at udvikle hjertesygdom, hvis du f.eks. er diabetiker, er kælderyger eller på rygeafvænning med nikotinprodukter. Din læge bør foretage yderligere undersøgelser.
- hvis du har været i overgangsalderen eller hvis du er en mand over 40 år **og** hvis du samtidig er diabetiker, kælderyger eller på rygeafvænning med nikotinprodukter. Din læge bør foretage yderligere undersøgelser.
- hvis du er i behandling for højt blodtryk (hypertension) og kontrolleres for dette.
- hvis du lider af nedsat lever- eller nyrefunktion.
- hvis du tidligere har lidt af krampeanfald eller epilepsi.
- hvis du tager SSRI (selektive serotoningenoptagshæmmere) eller SNRI (serotonin noradrenalingenoptagshæmmere) mod depression.

Hvis du tager Sumatriptan Viatriis regelmæssigt

Overdreven brug af Sumatriptan Viatriis kan medføre forværring af din hovedpine. Dette kan også forekomme, hvis du regelmæssigt tager anden smertestillende medicin til behandling af migræne. Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du mener dette gælder for dig.

Brug af andre lægemidler sammen med Sumatriptan Viatriis

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler. Det er særlig vigtigt for lægen eller apotekspersonalet at vide, om du bruger følgende:

- medicin til behandling af depression, serotoningenoptagshæmmere (SSRI-lægemidler) som f.eks. fluoxetin eller serotoningenoptagshæmmere (SNRI) som f.eks. venlafaxin eller duloxetin (som også bruges til at behandle visse urinvejslidelser). Hvis denne type medicin anvendes sammen med Sumatriptan Viatriis, kan de forårsage serotonin syndrom (en række symptomer som kan omfatte rastløshed, forvirring, svedudbrud, vrangforestillinger, øgede reflekser, muskeltrækninger, kulderystelser, øget hjerterytme og rysten). Fortæl det straks til lægen, hvis du får disse symptomer.
- lithium (medicin til behandling af alvorlig depression eller manisk depression – en sygdom, der er kendetegnet ved vekslende perioder med nedslåethed og hyperaktivitet) eller voldsom hovedpine såkaldt Hortons hovedpine.
- medicin der bruges til behandling af depression eller Parkinsons sygdom, kaldet MAO-hæmmere. Brug ikke Sumatriptan Viatriis hvis du har taget disse inden for de sidste 2 uger.
- Naturlægemidler, der indeholder prikbladet perikon.

Hvis du bruger eller har brugt anden medicin mod migræne

Hvis du har brugt anden migrænemedicin som f.eks. ergotamin eller ergotaminderivater eller andre triptaner (f.eks. naratriptan eller zolmitriptan), skal du vente i mindst 24 timer, inden du tager Sumatriptan Viatriis. Hvis du har taget sumatriptan, skal du vente mindst 6 timer, før du tager ergotamin eller ergotaminderivater (f.eks. metysergid) og vente mindst 24 timer, inden du tager andre typer triptaner.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Hvis du ammer, skal du være opmærksom på, at sumatriptan udskilles i modermælk.

Am ikke dit barn i 12 timer efter brug af Sumatriptan Viatris. Den mængde sumatriptan barnet modtager kan nedsættes, hvis du undlader at amme i 12 timer efter indtagelse af Sumatriptan Viatris. Modermælken bør pumpes ud og kasseres i den periode.

Nogle ammende kvinder rapporterede bryst- og/eller brystvorstesmerter efter anvendelsen af sumatriptan. Smerten er normalt forbigående og forsvinder efter 3 til 12 timer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel eller et migræneanfald kan gøre dig døsig, svimmel eller svag. Kør ikke bil og brug ikke værktøj eller maskiner, hvis du føler dig døsig, svimmel eller svag.

Sumatriptan Viatris indeholder lactose og natrium

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

3. Sådan skal du tage Sumatriptan Viatris

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

- Slug tabletterne med et glas vand.
- Tag medicinen så hurtigt som muligt ved de første tegn på migræneanfald. Du kan tage medicinen på ethvert tidspunkt under et migræneanfald.
- Denne medicin bør ikke anvendes forebyggende.

Voksne

Den anbefalede dosis er en 50 mg tablet. I nogle tilfælde kan lægen ordinere en dosis på 100 mg. Hvis den første tablet virker, men hovedpinen vender tilbage, kan du tage endnu en tablet efter mindst 2 timer. Du må ikke tage mere end 300 mg Sumatriptan Viatris i døgnet, og du bør altid vente i mindst 2 timer mellem første og anden dosis.

Hvis den første dosis af Sumatriptan Viatris ikke virkede, må du ikke tage endnu en dosis for at behandle samme migræneanfald. I stedet kan du tage en andet smertestillende middel, som indeholder paracetamol eller et non-steroidt anti-inflammatorisk lægemiddel (NSAID) som f.eks. aspirin (acetylsalicylsyre) eller ibuprofen.

Brug til ældre (over 65 år)

Sumatriptan Viatris bør ikke anvendes af ældre.

Brug til børn og unge (under 18 år)

Sumatriptan Viatris bør ikke gives til børn og unge.

Patienter med leverproblemer

Hvis du har leverproblemer, kan din læge anbefale, at du tager en lavere dosis.

Hvis du har taget for mange Sumatriptan Viatris tabletter

Kontakt straks lægen eller skadestuen, hvis du har taget flere Sumatriptan Viatriis tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. Medbring tabletbeholder og eventuelle resterende tabletter.

Kontakt din læge eller apotekspersonalet, hvis du har yderligere spørgsmål til anvendelsen af dette lægemiddel.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage Sumatriptan Viatriis og kontakt straks lægen eller nærmeste skadestue, hvis du får:

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra de eksisterende data):

- Allergiske reaktioner, inklusive alvorlige anafylaktiske reaktioner (som f.eks. hudreaktioner, som kan omfatte meget kløende udslæt og hævelse af huden, hævelse af tunge eller hals, åndedrætsbesvær og fald i blodtrykket)
- hjerteanfald (du kan mærke en snurren i kæben og ned i venstre arm, får kraftige brystmerter og åndedrætsbesvær),
- epileptiske anfald eller kramper (disse er mere sandsynlige hos patienter med tendens til epilepsi),
- betændelse i tyktarmen (som viser sig som mavesmerter med blodig diarré).

Andre bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

- kortvarig, forbigående blodtryksstigning umiddelbart efter indtagelse af tabletten
- snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i hænder og fødder, generel følelsesløshed.
- svimmelhed eller træthed/døsighed
- svaghedsfølelse
- rødme
- kvalme og opkastning (kan også skyldes selve migræneanfaldet)
- fornemmelse af tungthed, smerter, kulde- eller varmekølelse og trykken i alle dele af kroppen herunder brystet og halsen (se "Advarsler og forsigtighedsregler")
- vejtrækningsbesvær, stakåndethed
- muskelsmerter

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

- brystmerter

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

- små ændringer i resultater af leverfunktionsprøver (dette kan ses i blodprøver)

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- manglende muskelkontrol, rysten
- synsforstyrrelser og synstab herunder permanente synsskader (synsforstyrrelser kan også forekomme under et migræneanfald)
- langsom puls, hurtig puls, ændret hjerterytme (disse kan ses i 'EKG' test (elektrokardiogram) hos din læge, når lægen undersøger den elektriske aktivitet i hjertet)
- hjertebanken
- pludselige kraftige smerter i brystkassen
- lavt blodtryk
- kolde og hvide fingre og tæer (Raynauds syndrom)
- diarre
- nakkestivhed
- ledsmerter
- angst

- øget svedproduktion
- synkebesvær
- hvis du for nylig har haft en skade eller hvis du har betændelse (som gigt eller betændelse i tyktarmen), kan du opleve smerte eller en forværring af smerten på det sted, du har haft en skade eller har betændelse

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige opbevaringsbetingelser for dette lægemiddel.

Brug ikke Sumatriptan Viatriis efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Sumatriptan Viatriis indeholder:

- Aktivt stof: Sumatriptansuccinat svarende til 50 mg eller 100 mg sumatriptan.
- Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, mikrokrySTALLINSK cellulose, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat, titandioxid (E171), polydextrose, hypromellose, triacetin og macrogol. Filmovertrukket på 50 mg tabletterne indeholder jernoxid rød (E172) og jernoxid gul (E172). Se afsnit 2 "Sumatriptan Viatriis indeholder lactose og natrium".

Udseende og pakningsstørrelser

- 50 mg tabletterne er lyserøde, runde og filmovertrukne præget med "SU 50" på den ene side og "G" på den anden side.
- 100 mg tabletterne er hvide eller råhvide, runde og filmovertrukne præget med "SU 100" på den ene side og "G" på den anden side.

Sumatriptan Viatriis tabletter fås i blisterpakninger med: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 18, 20, 24 og 48 tabletter. Dit apotek vil udlevere det antal tabletter, som din læge har ordineret.

Blisterpakningen kan indeholde tomme trekantede støttelommer, der ikke indeholder tabletter. Kun de runde blisterlommer indeholder tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Viatriis Limited
Damastown Industrial Park
Mulhuddart
Dublin 15

Dublin
Irland

Repræsentant

Viatis ApS
Borupvang 1
2750 Ballerup

Fremstiller

Mylan B.V.
Krijgsman 20
1186 DM, Amstelveen
Holland

eller

Mylan Hungary Kft.
H-2900
Komárom
Mylan út.1
Ungarn

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2025.