

Hjertesvigt (kongestiv hjerteinsufficiens)

- Hvis du har hjertesvigt (kongestiv hjerteinsufficiens), og du mener, at dine symptomer (f.eks. åndenød eller hævede fødder) er blevet værre, eller du oplever et nyt tilfælde af sådanne symptomer, skal du straks søge læge.

Andre oplysninger (udfyld venligst)

Patientens navn:

Lægens navn:

Lægens tlf.nr.:

- Bær dette kort på dig i 2 måneder efter den sidste Benepali-dosis, da der kan forekomme bivirkninger efter din sidste dosis Benepali.

Patientkort

 **Benepali**TM

etanercept

DK

Dette kort indeholder vigtige oplysninger, som du skal være klar over, inden du får Benepali og under din behandling med Benepali. Hvis du ikke forstår disse oplysninger, skal du bede din læge om at forklare dem.

- Vis dette kort til læger, som er involveret i din eller dit barns behandling.

Infektioner

Benepali kan øge din risiko for at få infektioner, som kan være alvorlige.

- Du må ikke bruge Benepali, hvis du har en infektion. Kontakt lægen, hvis du er i tvivl.
- Hvis du får symptomer, som kan være tegn på infektion, som f.eks. feber, vedvarende hoste, vægttab eller apati, skal du straks søge læge.

- Du vil blive undersøgt for tuberkulose (TB). Bed din læge registrere datoerne og resultaterne for din sidste TB-screening nedenfor:

Test:

Dato:

Resultater:

Test:

Dato:

Resultater:

- Bed din læge angive dine andre lægemidler, som kunne øge din risiko for infektion.
