

Sjællæ

Jeg er i behandling med
ZYPADHERA® (olanzapin pamoat)

INDIKATION

Vedligeholdelsesbehandling
til voksne patienter med
skizofreni, som er tilstrækkeligt
stabiliserede med oral
olanzapin ved akut behandling.

I NØDSTILFÆLDE RING TIL:

**Den afdeling, der har ordineret
ZYPADHERA® (olanzapin pamoat)**

Afdeling: _____

Sygehus: _____

Tlf.: _____

Lokal lægevagt: _____

Tlf.: _____

ZypAdhera® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

- ZypAdhera kan i nogle tilfælde nå for hurtigt ud i blodbanen. Hvis det sker, kan du få nedenstående symptomer efter injektionen. I nogle tilfælde kan symptomerne medføre bevidstløshed:
 - Udtalt døsigthed, svimmelhed, forvirring, desorientering, talebesvær, gangbesvær, muskelstivhed eller -rystelser, svaghed, irriterabilitet, aggression, angst, stigning i blodtryk eller krampes
- Døsigthed
- Smerter på injektionsstedet

Nedenstående bivirkninger er set, når olanzapin er givet via munden, men de kan også forekomme efter administration af ZypAdhera.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 ud af 10 behandlede):

- Vægtøgning
- Døsigthed
- Forhøjet niveau af prolaktin i blodet
- I begyndelsen af behandlingen kan nogle patienter føle svimmelhed eller svaghed (med langsom puls), særligt når de rejser sig fra liggende eller siddende stilling. Det vil sædvanligvis gå over af sig selv, men hvis det ikke gør, så fortæl det til lægen

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

- Ændringer i mængden af visse blodceller, fedtstoffer i blodet samt forbigående forhøjede leverenzymmer tidligt i behandlingen
- Forhøjet niveau af sukker i blodet og urinen
- Forhøjet niveau af urinsyre og kreatinkinase i blodet
- Øget appetit
- Svimmelhed
- Rastløshed
- Rysten
- Usædvanlige bevægelser (dyskinesi)
- Forstoppelse
- Mundtørhed
- Udslæt
- Nedsat styrke
- Udtalt træthed
- Væskeophobning, som medfører hævede hænder, ankler eller fødder
- Feber
- Ledsmerter
- Seksuelle problemer såsom nedsat sexlyst (libido) hos mænd og kvinder eller rejsningsbesvær hos mænd

Kontakt lægen eller sygeplejersken, hvis du oplever bivirkninger, herunder mulige bivirkninger, som ikke er nævnt i dette patientkort.

VIGTIGE OPLYSNINGER TIL PATIENTER

ZYPADHERA® (olanzapin pamoat) kan i nogle tilfælde nå for hurtigt ud i blodbanen, hvilket kan give følgende bivirkninger:

Udtalt døsigthed, svimmelhed, forvirring, desorientering, talebesvær, gangbesvær, muskelstivhed eller -rystelser, svaghed, irriterabilitet, aggression, angst, stigning i blodtrykket eller krampes. Det kan også medføre bevidstløshed.

Derfor skal der tages følgende forholdsregler:

- Hver gang du får en injektion, holder lægen eller sygeplejersken dig under observation i mindst tre timer for at se, om der opstår nogen af ovenstående symptomer.
- Lægen eller sygeplejersken skal kontrollere, at du ikke har nogen af de ovenstående symptomer, før du tager hjem.
- Du kan godt få symptomer mere end tre timer efter injektionen, men det er usandsynligt. Hvis det skulle ske, skal du øjeblikkeligt kontakte lægen eller sygeplejersken.
- På grund af denne risiko skal du undlade at køre bil, motorcykel eller cykle samt at arbejde med maskiner resten af dagen efter en injektion.

Mens du er hos lægen eller på klinikken, skal du fortælle det til lægen eller sygeplejersken, hvis du:

- føler dig meget søvrig
- føler dig svimmel
- føler dig forvirret eller desorienteret
- føler dig irriterabel eller aggressiv
- føler angst
- har svært ved at tale eller gå
- føler dig svag
- oplever muskelstivhed eller -rystelser.

Lægen eller sygeplejersken skal kontrollere, at du er helt vågen og ikke har nogen symptomer, før du forlader klinikken. De skal også fortælle dig, hvad du skal gøre, hvis du får symptomer, efter at du har forladt klinikken.

Du kan finde flere oplysninger om ZYPADHERA® (olanzapin pamoat) i indlægssedlen.

Lilly

