



Oplysninger til patienten om OLUMIANT® (baricitinib)

Dette patientkort indeholder vigtige oplysninger, som du skal være opmærksom på før og under behandling med Olumiant.

Hav altid patientkortet med dig og vis det til andre læger og øvrigt sundhedspersonale, der er involveret i dine helbredsundersøgelser eller i din behandling.

Lægens telefonnummer:

Navn på lægen (der ordinerede Olumiant):

Dit navn:

Graviditet

- Tag ikke Olumiant, hvis du er gravid eller har mistanke om, at du kan være gravid.
- Brug sikker prævention, mens du tager Olumiant (og i mindst en uge efter, hvis du har stoppet behandlingen).
- Fortæl straks lægen, hvis du bliver (eller ønsker at blive) gravid.

Infektioner

Olumiant kan forværre en eksisterende infektion eller øge risikoen for, at du får en ny infektion eller øge risikoen for viral reaktivering. Fortæl straks lægen, hvis du får symptomer på en infektion f.eks:

- feber, sår, usædvanlig træthed, eller tandproblemer.
- hoste, der ikke vil gå over, nattesved og vægttab. Dette kan være tegn på tuberkulose (en infektionssygdom i lungerne).
- et smertefuldt hududslæt med blærer. Dette kan være et tegn på herpes zoster-infektion.

Fedt i blodet

Lægen kan kontrollere niveauet af fedt i dit blod, såsom dit kolesteroltal, mens du tager Olumiant.

Blodpropper

Olumiant kan forårsage en tilstand, hvorved der kan dannes en blodprop i dit ben, som kan vandre op til dine lunger. Fortæl straks lægen, hvis du får nogen af følgende symptomer:

- Hævelse eller smerte i det ene ben
- Varme eller rødme i det ene ben
- Stakåndethed, som ikke er forventet
- Hurtig vejrtrækning
- Brystsmerter