

OM DIN BEHANDLING

Du har fået ordineret Lixiana, et antikoagulerende lægemiddel, som fortynder blodet og hjælper med til at forhindre, at du får blodpropper. Det er vigtigt, at du tager din medicin nøjagtigt, som lægen har anvist det.

- Hvis du glemmer en dosis, skal du straks tage den, og derefter fortsætte den følgende dag som normalt – tag ikke det dobbelte af din ordinerede dosis på en enkelt dag.

- Start ikke andre lægemidler (herunder ikke-receptpligtige lægemidler) uden at kontakte lægen.
- Hold ikke op med at tage Lixiana uden at kontakte lægen, da det kan øge din risiko for at udvikle en blodprop.
- Læs indlægssedlen, der findes i alle pakninger med Lixiana.

HVORNÅR SKAL DU SØGE LÆGEHJÆLP?

RISIKO FOR BLØDNING

Når du tager antikoagulerende medicin, såsom Lixiana, kan det øge din blødningsrisiko. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de mulige tegn og symptomer på blødning, og **straks** tale med lægen, hvis du oplever et eller flere af følgende:

- Blå mærker eller blødning under huden
- Blod i urinen
- Ophostning af blod
- Opkastning af blod eller

materiale, der ligner kaffegrums

- Næseblod eller sår, hvor det tager lang tid at holde op med at bløde
- Sort afføring
- Svimmelhed eller pludselig hovedpine
- Uforklarlig træthed
- Unormal blødning fra skeden, herunder mere kraftig og langvarig menstruation

Kontakt lægen, hvis du oplever usædvanlige symptomer.

PATIENTKORT

Lixiana®

filmovertrukne tabletter

edoxaban

Du skal altid have dette kort på dig.

Vis det til sundhedspersonalet, farmaceuten, kirurgen eller tandlægen før nogen medicinsk behandling eller intervention.

PATIENTOPLYSNINGER

Patientnavn:

.....

Fødselsdato:

I nødstilfælde bedes du kontakte:

Navn:

Telefonnr.:

.....

BEHANDLINGSOPLYSNINGER

(Udfyldes af lægen)

Lixiana er blevet ordineret med en
dosis én gang dagligt på: mg

Startet den: / (mm/åå)

Blodtype:

Andre lægemidler/sygdomme:

.....

.....

.....

ORDINATIONSINFORMATION

For yderligere oplysninger eller i
nødstilfælde bedes du kontakte:

Lægens navn:

.....

Telefonnummer, stempel for
praksis:

.....

Lægens underskrift:

.....

INFORMATION TIL SUNDHEDSPERSONALE

- Lixiana er en oral antikoagulant faktor Xa-hæmmer.
- Når det er nødvendigt med et invasivt indgreb, skal Lixiana stoppes mindst 24 timer i forvejen, og der skal tages passende hensyn.
- Lixiana kan øge blødningsrisikoen. I tilfælde af klinisk signifikant blødning skal behandlingen straks stoppes.

- Koagulationstests, såsom international normaliseret ratio (INR), protrombintid (PT) eller aktiveret partiel tromboplastintid (aPTT), er ikke anvendelige til at måle virkningen af Lixiana. En kalibreret anti-faktor Xa-analyse kan imidlertid hjælpe med at informere ved kliniske beslutninger.

Se venligst produktresuméet for yderligere oplysninger.



Product under license of Daiichi Sankyo Europe GmbH
© 2025 Daiichi Sankyo.

© 2025 Organon group of companies.
All rights reserved.